



HÙNG NGUYỄN J.S.C
GMP-GLP-GSP

 **CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN - NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THỦ Y * GMP/GSP/GLP - WHO**



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THUỐC THỦ Y

CATALOGUE PRODUCTS

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



HUNG NGUYEN JSC.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Lời giới thiệu

Công ty CP Hùng Nguyên thành lập năm 2006 với khẩu hiệu hành động là “Hùng Nguyên đồng hành cùng người chăn nuôi”. Trong những năm qua, công ty luôn không ngừng phấn đấu để có những sản phẩm thuốc thú y chất lượng cao phục vụ hiệu quả cho người chăn nuôi trên toàn quốc.

Để đáp ứng với sự phát triển vượt bậc của ngành chăn nuôi, công ty Hùng Nguyên đã xây dựng xong nhà máy sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công nghiệp Mỹ Hào-Hung Yên.

Với đội ngũ kỹ thuật và công nhân được đào tạo chuyên sâu trong ngành chăn nuôi, thú y, dược học, hóa học. Cùng với dây chuyền sản xuất, trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến và hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Các sản phẩm của công ty được đúc kết từ những quy trình và phương pháp chăn nuôi. Sản phẩm của công ty đã được lưu hành trên nhiều vùng miền trong cả nước và được người chăn nuôi chấp nhận với hiệu quả cao.

Kính chúc bà con chăn nuôi thành công và thu được nhiều lợi nhuận !



Sản phẩm Kháng sinh dung dịch tiêm

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 20ml, 100ml

O.D.Flor

(Florfenicol, Oxytetracyclin)

Đặc trị: Sung phù đầu, thương hàn, viêm phổi, ho, suyễn.

Công dụng:

- Đặc trị sung phù đầu, thương hàn, tiêu chảy, viêm phổi, ho, suyễn, tụ huyết trùng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, dùng hỗ trợ điều trị bệnh kể phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn.
- Đặc trị CRD, phân xanh, phân trắng, phân vàng nhớt trên gia cầm...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da

- **Trâu, Bò:** 1ml / 15-20kg TT
 - **Lợn, Dê, Cừu:** 1ml / 10kg TT
 - **Chó, Mèo:** 1ml / 8-10kg TT
 - **Gà, Vịt:** 1ml / 5kg TT
- Hòa với 1 lít nước cho uống
Dùng từ 3-5 ngày.



Chai 20ml, 100ml

Doxy-Flor

(Doxycyclin, Florfenicol, Dexamethasol)

Đặc trị các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, sốt bỏ ăn

Công dụng:

- Đặc trị viêm phổi, ho, suyễn, sốt phát ban, co giật tím tái, sốt cao bỏ ăn, chứng viêm ruột hoại tử, thương hàn, E.coli, tiêu chảy, bệnh Lepto, viêm đường sinh dục
- Hỗ trợ điều trị bệnh kể phát tai xanh ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da

- **Trâu, bò:** 1ml / 20kg TT / ngày
 - **Lợn, dê:** 1ml / 10kg TT / ngày
 - **Lợn, dê con:** 1ml / 5kg TT / ngày
 - **Chó, mèo:** 1ml / 3-4kg TT / ngày.
- Bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại sau 24 - 48h.



Chai 20ml, 100ml

Tylan-MC

(Tylosin base)

Đặc trị: Viêm phổi, ho, suyễn, CRD, tiêu chảy, E.coli phù đầu.

Công dụng:

- Đặc trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản, hen, suyễn, viêm ruột tiêu chảy, bệnh nhiễm trùng kể phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân, tụ huyết trùng, E.coli sung phù đầu, phân vàng nhớt, bệnh CRD, viêm xoang ở gia cầm...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da

- **Gia súc:** 1ml / 15 - 20kg TT / ngày
 - **Lợn:** 1ml / 10-15kg TT / ngày
- Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24 giờ.
- **Gà, vịt, ngan:** 1ml / 10-15kg TT, hoặc 1ml hòa với 1 lít nước uống.



Chai 10ml, 20ml, 100ml

NGH - Gentatylo

(Gentamycin, Tylosin)

Điều trị các bệnh viêm đường hô hấp, tiêu hóa.

Công dụng:

- Đặc trị các bệnh viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn, sung phù đầu, đóng dấu, tụ huyết trùng, viêm ruột ỉa chảy, hồng ly, kiết ly, viêm tử cung, viêm vú, viêm móng ở gia súc.
- Bệnh tiêu chảy, hen, CRD, mào đen ở gia cầm...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiếp bắp

- **Trâu, bò:** 1ml / 20 -30kg TT / ngày
 - **Lợn, dê, nghé:** 1ml / 15-20kg TT / ngày
 - **Lợn con, chó, mèo:** 1ml / 5-10kg TT / ngày
 - **Gia cầm:** 1ml / 5-8kg TT / ngày
- Dùng liên tục 3-5 ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch tiêm



Chai 20ml, 100ml

Norcoli

(Norfloxacin)

Đặc trị tiêu chảy, tụ huyết trùng, thương hàn, Ecoli

Công dụng:

Đặc trị viêm ruột ỉa chảy, phân vàng, phân nhớt, bạch ly, Ecoli sung phù đầu, thương hàn, tụ huyết trùng, viêm phế quản truyền nhiễm.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Trâu, bò, lợn, chó, mèo:**

1ml / 10-15kg TT / ngày

- **Gia cầm:** 1ml / 5 - 8kg TT / ngày

Dùng liên tục 3 - 5 ngày.



Chai 10ml, 20ml, 100ml

Vibramycin-Forte

(Doxycyclin, Dexamethason)

Đặc trị bệnh: ho, suyễn, viêm phổi.

Công dụng:

Điều trị hiệu quả các bệnh viêm đường hô hấp: ho, suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, CRD, tụ huyết trùng, sung phù đầu, ỉa chảy...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp.

- **Trâu, bò, lợn:**

1ml / 10-20kg TT / ngày

- **Lợn con, chó, mèo:**

1ml / 5-8kg TT / ngày

- **Gia cầm:** 1ml / 5kg TT / ngày

Dùng liên tục 3-5 ngày.



Chai 20ml, 100ml

Enroflox

(Enrofloxacin)

Đặc trị tiêu chảy, Ecoli

Công dụng:

Đặc trị bệnh tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, phân vàng, tụ huyết trùng, thương hàn, Ecoli sung phù đầu ở gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Lợn:**

1ml / 10-20kg TT / ngày

- **Trâu, bò:**

1ml / 30kg TT / ngày

- **Gia cầm:**

1ml / 8-10kg TT / ngày

Dùng liên tục 3-5 ngày



Chai 20ml, 100ml

Thiamphenicol - 20%

(Thiamphenicol)

Đặc trị: Thương hàn, tiêu chảy, Ecoli sung phù đầu

Công dụng:

Điều trị các bệnh thương hàn, tụ huyết trùng, ỉa chảy, phân vàng, phân nhớt, viêm ruột hoại tử, bạch ly, chướng bụng đầy hơi, sung phù đầu.

Hỗ trợ điều trị kể phát bệnh sốt đỏ, tai xanh.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Bè, nghé:** 1ml/ 15kg TT/ ngày

- **Lợn, dê, cừu:** 1ml/ 15kg TT/ ngày

- **Chó, mèo:** 1ml / 8-10kg TT / ngày

* **Chú ý:** không nên tiêm quá 10ml trên cùng 1 vị trí tiêm.

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch tiêm

HÙNG NGUYÊN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 20ml, 100ml

Tyfoid - 10

(Enrofloxacin)

Đặc trị thương hàn, tiêu chảy, Ecoli sung phù đầu.

Công dụng:

- Gia súc: Đặc trị tiêu chảy cấp, thương hàn, viêm ruột hoại tử, Ecoli sung phù đầu, phân trắng, phân vàng, viêm vú, viêm tử cung...
- Gia cầm: Đặc trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng, viêm xoang, CRD, tụ huyết trùng hen khặc...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Đại gia súc và lợn:**
1ml / 10-15kg TT / ngày

- **Tiểu gia súc:**
1ml / 20-30kg TT / ngày

- **Gà, vịt, cút:**
1ml / 10-15kg TT / ngày
Hoặc 1ml / 1 lít nước uống.



Chai 20ml, 100ml

Coliseptyl

(Colistin)

Đặc trị tiêu chảy, viêm ruột hoại tử, Ecoli sung phù đầu

Công dụng:

Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân nhớt vàng, thương hàn, Ecoli phù đầu, tụ huyết trùng, viêm phổi, ho thỏ, lợn con phân trắng...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Trâu, bò, dê, cừu:**
1ml / 20kg TT / ngày

- **Lợn:**
1ml / 10kg TT / ngày

- **Chó, mèo:**
1ml / 3-5kg TT / ngày



Chai 20ml, 100ml

Ampisep

(Ampicillin, Sulfadimidin, Trimethoprim)

Đặc trị Sung phù đầu, Tụ huyết trùng, Tiêu chảy

Công dụng:

Đặc trị sung phù đầu, đóng dấu, tụ huyết trùng, viêm ruột ỉa chảy, lợn con phân trắng, viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Trâu, Bò, Lợn:**

1 ml/ 20-30 kg TT

- **Lợn con, Chó, Mèo:**

1 ml/ 10-20 kg TT

- **Gia cầm:**

1 ml/ 5-10 kg TT



Chai 20ml, 100ml

Colimycin

(Colistin sulfate)

Đặc trị Tiêu chảy, Ecoli, sung phù đầu, tụ huyết trùng

Công dụng:

Đặc trị viêm ruột, viêm dạ dày, tiêu chảy, E.coli, sung phù đầu, thương hàn, chướng bụng đầy hơi, viêm màng não, tụ huyết trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Colistin ở gia súc và gia cầm...

Hướng dẫn sử dụng:

- **Trâu, Bò, Dê, Cừu:**

1 ml/ 40 kg TT/ ngày

- **Lợn:** 1 ml/ 10-20 kg TT/ ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch tiêm



Chai 10ml, 100ml

Kanamycin - 10%

(Kanamycin)

Đặc trị Viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn

Công dụng:

Đặc trị bệnh viêm phổi, lao phổi, viêm phế quản, CRD, hen, suyễn, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm móng và các nhiễm trùng thứ phát...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Bê, Nghé, Dê, Cừu:**
1 ml/ 20 kg TT. Ngày 2 lần
- **Lợn:** 1 ml/ 5 -10 kg TT/ lần.
Ngày 2 lần
- **Chó, Mèo:** 1 ml/ 5 kg TT/ ngày.



Chai 100ml

Lincomycin - 10%

(Lincomycin)

Đặc trị viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung; áp xe gan, phổi; sưng phù đầu

Công dụng:

Đặc trị viêm khớp, viêm vú, viêm tử cung, viêm đường tiết niệu. Viêm phổi, viêm phế quản truyền nhiễm, áp xe gan, phổi, viêm da và mô mềm...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Trâu, bò, dê, cừu, lợn:**
1ml / 10kg TT / ngày
Dùng liên tục 5-7 ngày
- **Chó, mèo:** 2,5ml / 10kg TT / ngày



Chai 20ml, 100ml

Marbofloxacin

(Marbofloxacin)

Đặc trị thương hàn, Viêm phổi, tiêu chảy

Công dụng:

Đặc trị bệnh thương hàn, viêm phổi, sưng phù đầu, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, ỉa chảy cấp và mạn.

Hướng dẫn sử dụng:

- **Lợn, Dê, Cừu:**
1 ml/10 kg TT/ ngày
- **Trâu, Bò, Ngựa:**
1 ml/10 kg TT/ ngày
- **Chó, Mèo:**
1 ml/8-10 kg TT/ ngày



Chai 20ml, 100ml

Flophenicol - 30%

(Florfenicol)

Đặc trị viêm phổi, ho suyễn, thương hàn, tiêu chảy.

Công dụng:

- Lợn: Đặc trị ho, suyễn, viêm phổi, tụ huyết trùng, bạch ly, hồng ly, tiêu chảy, phù đầu, thương hàn, sử dụng trong điều trị bệnh tai xanh (PRRS)...

- Trâu, bò, dê, cừu: đặc trị tiêu chảy, ly, thương hàn, viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh ký sinh trùng đường máu, viêm vú, viêm tử cung...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
Không tiêm quá 10 ml trên một vị trí tiêm.

*** Trâu, Bò, Dê, Cừu:**

- Tiêm bắp: 1 ml/ 15 kg TT mỗi liều cách nhau 48 giờ.

- Tiêm dưới da: 2 ml/ 15 kg TT tiêm 1 liều duy nhất.

*** Lợn:** Tiêm bắp: 1 ml/ 20 kg TT

Mỗi liều cách nhau 48 giờ.

Không sử dụng thuốc cho trâu, bò trong thời kỳ khai thác sữa.

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch tiêm

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 20ml, 100ml

Tylan (2000) - LA

(Tylosin)

Đặc trị Ho, viêm phổi dinh sùn, thỏ giết bụng

Công dụng:

Đặc trị ho, suyễn, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp và mãn tính, viêm phổi dính sùn, viêm vú, viêm khớp, viêm móng, hội chứng mất sữa truyền nhiễm, tụ huyết trùng cấp tính, lepto, đóng dấu lợn, sung phù đầu do Ecoli...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp thịt

- **Trâu, bò, lợn, cừu:**
1ml / 15-20kg TT / ngày

- **Lợn con, chó, mèo:**
0,5-1ml / 10-15kg TT

Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24-48 giờ

* **Chú ý:** không tiêm quá 10ml trên cùng 1 vị trí tiêm.



Chai 20ml, 100ml

Tylan @ (2000) - LA

(Tylosin)

Đặc trị viêm phổi, hen, suyễn, lepto, viêm ruột kiết lỵ

Công dụng:

- Đặc trị ho, suyễn, viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp và mãn tính, viêm phổi ho khan, khó thở. Viêm ruột ỉa chảy, tụ huyết trùng, lepto, bệnh đóng dấu, sung phù đầu do Ecoli.
- Sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm khuẩn kể phát, sốt đỏ, tai xanh (P.R.R.S) ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:

- **Trâu, Bò, Lợn, Cừu:** 1ml / 15-20 kg TT.

- **Lợn con, Chó, Mèo:**
0,5-1ml / 10-15 kg TT.

Bệnh nặng có thể tiêm nhắc lại sau 24 - 48 giờ.

- **Gia cầm:** 1ml / 20kg TT



Chai 20ml, 100ml

Bromhexin

(Bromhexin HCl)

Giảm ho, long đờm, giảm tiết dịch nhày

Công dụng:

Giảm tiết dịch nhày, giảm ho, long đờm, giãn phế quản. Dùng trong các trường hợp viêm phổi, viêm phế quản, CRD, CCRD, hen suyễn, dị ứng thời tiết, Stress trong quá trình vận chuyển...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Bè, Nghé, Dè, Cừu:**

0,5-1ml / 10 kg TT / ngày.

- **Lợn, Chó, Mèo:** 1ml / 10 kg TT / ngày.

- **Gà, Vịt:** 1ml / 5-8 kg TT / ngày
Dùng từ 3-5 ngày.



Chai 20ml, 100ml

Pion - Linspec

(Lincomycin, Spectinomycin)

Viêm vú, viêm tử cung, viêm xương khớp, viêm móng

Công dụng:

Đặc trị nhiễm trùng do vi khuẩn E.coli, Campylobacter, Mycoplasma, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus và Treponema spp, gây nhiễm trùng tiêu hóa, viêm ruột ỉa chảy, thương hàn, kiết lỵ, phân xanh, phân trắng...
Gây nhiễm trùng hô hấp, hen suyễn, viêm phổi dính sùn, viêm móng, viêm vú, viêm tử cung, viêm xương khớp ở lợn và đại gia súc...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp (IM). Từ 3-5 ngày

- **Bè, nghé, dè, cừu:**

1ml / 15kg TT / ngày

- **Heo:**

1ml / 10-15kg TT / ngày

- **Chó, mèo:**

1ml / 8-10kg TT / ngày

Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 14 ngày, sữa 3 ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYỄN JSC

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch tiêm



Chai 20ml

Dramycin

(Tulathromycin)

Đặc trị Ho, viêm phổi cấp, viêm phổi dinh sùon

Công dụng:

- Lợn: đặc trị ho, viêm phổi cấp, viêm phổi dính sườn, Circo, tai xanh.... Bệnh hô hấp gây ra bởi vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae nhạy cảm với Tulathromycin.
- Trâu, bò: phòng và trị bệnh đường hô hấp gây ra bởi các vi khuẩn: Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis..., viêm kết mạc do vi khuẩn Moraxella bovis...

Hướng dẫn sử dụng:

- Pha loãng được với nước cất.
Tiêm bắp 1 liều duy nhất
- **Trâu, bò, dê, cừu:** 1ml / 40kg TT
 - **Lợn:** 1ml / 30-40kg TT. Có thể tiêm nhắc lại sau 5-7 ngày
- * **Chú ý:** không tiêm quá 2ml trên 1 vị trí tiêm đối với Lợn, và 7,5ml trên Trâu, bò, dê, cừu.
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ :
Trâu, bò: 49 ngày, Lợn 33 ngày.



Chai 20ml, 100ml

Gen Coli-D

(Gentamycin, Colistin)

Thương hàn, E.coli phủ đầu, viêm phổi, hen suyễn, bò ăn...

Công dụng:

- Gia súc: trị thương hàn, E.coli phủ đầu, tiêu chảy, ho, viêm phổi, tụ huyết trùng, sốt đỏ, bỏ ăn không rõ nguyên nhân...
- Gia cầm: trị tụ huyết trùng, thương hàn, E.coli kéo màng, CRD, tiêu chảy phân xanh, phân trắng...

Hướng dẫn sử dụng:

- Tiêm bắp (IM), hoặc tiêm dưới da (SC)
- **Heo:** 1ml/10-15kg TT/ngày
 - **Trâu, bò:** 1ml/20kg TT/ngày
 - **Dê, cừu:** 1ml/10-15kg TT/ngày
 - **Gia cầm:** 1ml/10-15kg TT/ngày
- Dùng liên tục 3-5 ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ :
10 ngày. Sữa : 02 ngày



Chai 20ml

CẬP ĐÔI ĐẶC BIỆT CHUYÊN TRỊ BỆNH CHÓ MÈO

(BUTASAL-B12 VÀ PION LINSPEC)

Công dụng:

Chuyên trị: Chó, mèo viêm phổi, ho thở thể bụng, sốt cao, co giật, nôn khan, ói mửa, kiết lỵ, bại liệt, viêm tử cung, tiết niệu.

Hướng dẫn sử dụng:

* **PION-LINSPEC:**

- Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
 - Chó, mèo: 1-2ml/10kg TT/ngày, dùng từ 3-5 ngày
 - Lưu ý: nên tiêm với Butasal-B12 để thú nhanh chóng phục hồi sức khỏe.
- Nên trộn chung 2 loại theo tỷ lệ 1:1 được 2-4ml tiêm cho 10kg TT/ngày
Thời gian ngừng dùng thuốc 14 ngày

* **BUTASAL-B12:**

- Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
- Liều chung cho chó mèo: 1-2ml/10kg TT/ngày, dùng từ 3-5 ngày



Sản phẩm Kháng sinh hỗn dịch tiêm

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 20ml, 100ml

Pion-Amogen

(Amitron, Gentamycin)

Đặc trị Ho, suyễn, viêm phổi. Nhiễm trùng cấp và mãn tính

Công dụng:

- Đặc trị viêm phổi dính sườn, ho, suyễn, viêm teo mũi truyền nhiễm, viêm vú (MMA), viêm tử cung
- Trị viêm ruột tiêu chảy do E.coli, thương hàn do Salmonella...

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc kỹ trước khi dùng. Tiêm bắp

* **Liều chung:** 1ml/10kg TT/ngày

- **Heo:** 1ml/10-15kg TT/ngày

- **Bê, nghé:** 1ml/20-25kg TT/ngày

- **Dê, cừu non:** 1ml/15-20kg TT/ngày

- **Chó, mèo:** 1ml/8-10kg TT/ngày

- **Ngựa con:** 1ml/40-50kg TT/ngày

- **Ngựa con:** 1ml/15-20kg TT/ngày

Ngưng dùng thuốc trước khi giết mổ 30 ngày, sữa 02 ngày



Chai 20ml, 100ml

Amox - LA

(Amoxicillin, Clavulanic acid)

Đặc trị Ho, suyễn, viêm phổi. Nhiễm trùng cấp và mãn tính

Công dụng:

- Gia súc: Đặc trị viêm phổi, viêm phế quản, ho, suyễn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng phần mềm, áp xe, viêm vú, viêm tử cung, bệnh ỉa chảy, phù đầu ở lợn cai sữa, lepto, sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm trùng kế phát, sốt đỏ, tai xanh ở lợn.
- Chó, Mèo: Trị viêm phổi, viêm phế quản, viêm da và mô mềm, viêm ruột ỉa chảy...

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc kỹ trước khi dùng

Tiêm bắp thịt

- **Lợn:** 1 ml/15-20 kg TT/ ngày

- **Bê, Nghé, Dê, Cừu:**

1 ml/20 kg TT/ ngày

- **Chó, Mèo:**

1 ml/10-15 kg TT/ ngày



Chai 20ml, 100ml

Amoxillin - LA

(Amoxicillin)

Đặc trị Ho, suyễn, viêm phổi, nhiễm trùng cấp

Công dụng:

Đặc trị viêm phổi, viêm phế quản, ho, suyễn, tụ huyết trùng, đóng dấu, các nhiễm trùng kế phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn, hội chứng viêm vú, viêm tử cung, mất sữa (MMA), trị viêm khớp, viêm móng, thối móng, phòng và trị phân trắng, phân xanh, phân vàng, viêm ruột hoại tử, thương hàn, phó thương hàn.

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc kỹ trước khi dùng

Tiêm bắp thịt

Liều chung cho các loài:

1 ml/ 10-15 kg TT

Tiêm nhắc lại sau 48 giờ

Lưu ý: Không được tiêm quá 20 ml ở Trâu, Bò; 10 ml ở Lợn; 5 ml ở Dê, Cừu cùng một vị trí tiêm.



Chai 20ml, 100ml

Gentamox - LA

(Gentamycin, Amoxycillin)

Đặc trị hiệu quả các bệnh nhiễm trùng cấp

Công dụng:

Đặc trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản, ho, suyễn, thương hàn, ỉa chảy kéo dài. Tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, phân trắng, ở lợn con. Các bệnh kế phát bệnh lợn tai xanh, sốt đỏ

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

Liều chung: 1ml/10kg TT

Bệnh nặng tiêm nhắc lại sau 24-48h



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

**Sản phẩm
Kháng sinh dung dịch uống**



Chai 20ml, 100ml

Ceptimax - LA

(Ceptiofur)

Đặc trị Ho, viêm phổi, nhiễm trùng cấp, viêm vú, viêm tử cung

Công dụng:

- Đặc trị viêm phổi, viêm phổi dính sườn, ho, hen. Hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng nặng như viêm khớp, viêm tử cung, viêm vú.
- Tiêu chảy phân trắng, phân vàng do Salmonella, E.coli
- Các bệnh nhiễm trùng kể phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp thịt. Lắc kỹ trước khi dùng:

- **Gia súc:** 1ml/50 kg TT/ ngày
 - **Bê, Nghé:** 1ml/50 kg TT
 - **Lợn:** 1 ml/16 kg TT
- Dùng liên tục từ 3-5 ngày
* **Chú ý:** không được tiêm quá 10 ml trên cùng 1 vị trí tiêm.



Chai 20ml, 100ml

Flumequin-LA

(Flumequin)

Đặc trị thương hàn, tiêu chảy phân vàng.

Công dụng:

Thuốc có tác dụng tốt, điều trị các bệnh: tiêu chảy do Ecoli, thương hàn, viêm phổi, sưng phù đầu, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung. Phân vàng, phân trắng lợn con. Chướng điều khô chân ở gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Lợn, Dê, Cừu:** 1ml/ 10 kg TT/ ngày
 - **Trau, Bò, Ngựa:** 1ml/ 20 kg TT/ ngày
 - **Gia cầm:** 1 ml/5-8 kg TT/ ngày
- Dùng 3-5 ngày.



Chai 50ml, 100ml

Azi - Flor

(Azithromycin, Florfenicol)

Đặc trị Ho, viêm phổi dính sườn, thỏ giạt bụng, sốt bỏ ăn không rõ nguyên nhân.

Công dụng:

- Đặc trị viêm đường hô hấp, ho suyễn, viêm phổi dính sườn, thỏ giạt bụng, sốt cao bỏ ăn không rõ nguyên nhân...
- Đặc trị tiêu chảy cấp, nhiễm trùng đường tiêu hóa E.coli, thương hàn, phân vàng nhớt, tụ huyết trùng...
- Điều trị bệnh kể phát sốt đỏ, tai xanh...

Hướng dẫn sử dụng:

Lắc kỹ trước khi dùng.

Tiêm sâu bắp thịt.

- **Lợn:** 1ml / 10-20kg TT
 - **Bê, nghé, dê, cừu:** 1ml / 10-15kg TT
- Dùng từ 3-5 ngày
- Nhiễm trùng nặng tiêm nhắc lại sau 24 - 48 giờ.

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch uống

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Enro - 10

(Enrofloxacin)

Đặc trị Lợn con phân trắng, phân vàng nhợt, phồng thương hàn.

Công dụng:

Đặc trị lợn con phân trắng, phân vàng nhợt, thương hàn, E.coli, viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm phế quản truyền nhiễm, sung phù đầu...

Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ trực tiếp vào miệng hoặc hoà vào nước cho uống.
Lợn: 1 ml/10-15 kg TT.
Dùng liên tục 2-3 ngày.



Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Tylocol

(Tylosin)

Đặc trị Hen gà, khếch vịt, Ecoli sung phù đầu.

Công dụng:

- Đặc trị bệnh Gumboro, viêm màng não, sốt cao, hen gà, khếch vịt, tụ huyết trùng, phân xanh, phân trắng, chướng điều khô chân, quay đầu rụt cổ, sốt cao bỏ ăn.
- Gia súc: Đặc trị bệnh hen, suyễn, viêm phổi, tụ huyết trùng, E.coli, sung phù đầu, Lợn con phân trắng...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc nhỏ trực tiếp vào miệng
- **Gà, Vịt, Ngan, Ngỗng:** 100ml dùng cho 200-300 kg TT/ngày
Dùng từ 3-5 ngày
Liều phòng bằng 1/2 liều điều trị
- **Lợn:**
100 ml dùng cho 1000 kg TT/ ngày
Dùng liên tục từ 3-5 ngày



Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Alicin

(Alicin)

Phòng cảm cúm, toi rù, chướng điều khô chân, đầy hơi ở gia súc, gia cầm

Công dụng:

- Phòng ngừa bệnh cúm ở gia súc, toi, rù ở gia cầm. Chướng bụng đầy hơi gia súc, chướng điều khô chân ở gia cầm.
- Ngừa bệnh tiêu chảy cấp và mạn tính, phòng chống bệnh tật.
- Nâng cao sức đề kháng

Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống
- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 10 ml (10 lần bơm) hoà với 1 lít nước cho uống
Hoặc nhỏ trực tiếp 1-2 giọt (0,1-0,2 ml) vào miệng
- **Lợn, Bè, Nghé:**
10 ml (10 lần bơm)/ 5 kg TT. Hoặc hoà vào 0,5 lít nước cho uống.



Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lít

Coliracin

(Colistin)

Đặc trị Ecoli sung phù đầu, thương hàn, tiêu chảy.

Công dụng:

Đặc trị sung phù đầu, Ecoli, thương hàn, ỉa chảy, đầy hơi ở gia súc, lợn con phân trắng. Bệnh viêm màng não, bệnh đậu ở gà...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc nhỏ trực tiếp vào miệng
- **Lợn:** 1ml / 10 kg TT/ ngày. Dùng liên tục từ 2-3 ngày.
- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 1ml / 6-7 kg TT/ ngày. Hoặc 1ml pha với 1 lít nước cho uống.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch uống



Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lit

Enroflox - 10%

(Enrofloxacin)

Đặc trị Rù, toi, chướng điều khô chân ở gia cầm

Công dụng:

Đặc trị rù toi, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, chướng điều khô chân, CRD, E.coli, bại liệt, sã cánh, xù lông, bỏ ăn, bạch ly, phân nhớt vàng, sung phù đầu, viêm xoang mũi.

Hướng dẫn sử dụng:

Cho uống trực tiếp hoặc pha vào nước cho uống trong 3-5 ngày:

- **Gà, Vịt, Ngan:**

1 ml /3-5 kg TT/ ngày

Hoặc pha 1 ml/1 lít nước cho uống

- **Lợn:** 1 ml/7-10 kg TT/ ngày.



Chai 10ml, 100ml, 500ml, 1 lit

Spectin - 5%

(Spectinomycin)

Đặc trị bệnh lợn con phân trắng

Công dụng:

Đặc trị viêm ruột ỉa chảy, lợn con phân trắng, nhiễm khuẩn, E.coli huyết ở lợn con.

Hướng dẫn sử dụng:

Lợn con cho uống với liều sau:

- Liều phòng hệ thống:

Dùng liều duy nhất 3 ml/con. Dùng càng sớm càng tốt sau khi sinh.

- Liều chữa: 1ml/2 kg TT. Ngày uống 2 lần. Dùng liên tục từ 3-5 ngày.



Chai 10ml, 100ml, 1 lit

Doxy-Flor

(Doxycyclin, Flophenicol)

Đặc trị: Hô hấp phổ rộng, CRD, thương hàn, tụ huyết trùng

Công dụng:

- Đặc trị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi, viêm phổi dính sườn, sung phù đầu, ho, suyễn, chảy nước mũi, thở khó, CRD, ORT, hen gà, khếch vịt, thương hàn, bạch ly, chướng điều, khô chân...ở gia cầm

- Trị viêm ruột, phân trắng, phân vàng nhớt, phân lẫn máu, viêm vú, viêm tử cung ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

Liều chung cho gia súc, gia cầm: 1ml/10-20kg TT/ngày

1ml/1-2 lít nước uống hoặc 1ml/500g-1kg thức ăn. Dùng từ 3-5 ngày

Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 15 ngày



Chai 100ml, 500ml, 1 lit

Brom-Oral (Hương bạc hà)

(Bromhexin, tinh dầu)

Giảm tiết dịch nhày, chống viêm phế quản tắc nghẽn, hen khếch, khó thở

Công dụng:

- Bromhexin kết hợp với các loại tinh dầu thảo dược giúp vật nuôi giảm nhanh các triệu chứng ho, hen suyễn, khó thở, làm mát họng, giảm tiết dịch nhày, giảm ho, loãng đờm, thông tắc khí quản, giúp tỉnh táo ở gia súc, gia cầm.

- Nên dùng kết hợp với kháng sinh trị bệnh viêm phổi, viêm phế quản tắc nghẽn, OLT, ORT, hen suyễn, CRD ở gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:

Pha với nước cho uống. Dùng từ 3-5 ngày

- Gia cầm: 1ml/15-20kg TT/ngày, hoặc 1ml/2-4 lít nước uống

- Gia súc: 1ml/15kg TT/ngày.

- Hen nặng: nên pha 25ml với 1 lít nước rồi phun trực tiếp lên vật nuôi.

Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 03 ngày, trứng 06 ngày



Chai 1 lít

Thiam-Oral

(Thiamphenicol)

Đặc trị: Thương hàn, bạch ly, viêm ruột hoại tử trên gia cầm

Công dụng:

- Đặc trị: Thương hàn, E.coli, tiêu chảy phân vàng nhớt, Phân xanh, phân trắng, bạch ly, viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, chướng điều khô chân, hen, khặc, CRD trên gia cầm
- Phòng và trị: Viêm buồng trứng do Salmonella gây đẻ non, trứng méo mó, sần sùi
- Dùng tốt trong úm gà, vịt, ngan.

Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước cho uống.

Không được tiêm

- **Gà, vịt, ngan, cút:** 1ml/8-10kg TT/ngày
Hoặc hòa với 1-2 lít nước cho uống
- **Úm gà, vịt:** 1ml/0,5-1 lít nước cho uống
- * **Đặc biệt:** Thuốc không ảnh hưởng đến tỷ lệ đẻ trứng trên gia cầm
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 28 ngày



Chai 100ml, 1 lít

Flor - 10% Oral

(Florfenicol)

Đặc trị viêm phổi, thương hàn, tiêu chảy ghép E.coli.

Công dụng:

- Gia cầm: Đặc trị bệnh thương hàn, tiêu chảy ghép E.coli, hen gà, khặc vịt, viêm phổi, CRD, CCRD, viêm xoang mũi, vẩy mủ, mào thâm, sã cánh...
- Gia súc: Đặc trị phó thương hàn, tiêu chảy do E.coli, phù đầu, viêm phổi, viêm phế quản, tụ huyết trùng ở Trâu, Bò, Lợn, Dê.
Đặc biệt hiệu quả với các bệnh nhiễm trùng kế phát, sốt đỏ, tai xanh ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hoà nước cho uống, hoặc nhỏ trực tiếp vào miệng.
- **Gia cầm:** 1 ml/10 kg TT/ ngày.
Hoặc 1 ml hoà với 1 lít nước cho uống. Dùng trong 3 ngày.
- **Lợn, Bè, Nghé, Dê, Cừu:** 1 ml/10 kg TT/ ngày.
Hoặc 1 ml hoà với 1 lít nước uống. Dùng trong 5 ngày.



Chai 100ml, 1 lít

Enro - 20% Oral

(Enrofloxacin)

Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, tụ huyết trùng ghép E.coli.

Công dụng:

- Gia cầm: Đặc trị viêm phổi, CRD, hen gà, khặc vịt, tiêu chảy ghép E.coli, tụ huyết trùng, phân xanh, phân trắng, phân sấp.
- Gia súc: Đặc trị viêm ruột hoại tử, tiêu chảy, E.coli, sung phù mắt, Lợn con phân trắng, viêm vú, viêm tử cung, tụ huyết trùng và những bệnh nhiễm trùng kế phát ở Lợn, Trâu, Bò...

Hướng dẫn sử dụng:

- Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống
- **Gia cầm:** 1ml/ 8 - 10 kg TT/ ngày hoà với 1 lít nước cho uống.
- **Lợn, Dê, Bè, Nghé:** 1ml/ 40 kg TT/ ngày.
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.



Chai 100ml

Timicos - 250 Oral

(Tilmicosin)

Đặc trị viêm phổi, hen, suyễn, CRD ở gia súc, gia cầm.

Công dụng:

- Đặc trị viêm phổi, hen suyễn, CRD, khặc, khô khè, sung phù mắt, viêm mủ, viêm xoang mũi, tụ huyết trùng, và các bệnh nhiễm trùng kế phát ...

Hướng dẫn sử dụng:

- Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống
- **Gà, Vịt, Cút:** 6-8 ml/ 100 kg TT/ ngày.
Hoặc 30 ml/100 lít nước cho uống.
- **Lợn:** 6-8 ml/ 100 kg TT/ ngày.
Hoặc 80 ml/ 100 lít nước cho uống.
- **Bè, Nghé, Dê, Cừu:** 1 ml/ 20 kg TT, 2 lần/ ngày
Dùng liên tục 3-5 ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Kháng sinh dung dịch uống



Chai 100ml

Doxy - Oral

(Doxycyclin)

Đặc trị Hen suyễn, viêm phổi, CRD ở gia súc, gia cầm.

Công dụng:

Đặc trị các bệnh viêm phổi, hô hấp mạn tính, hen, suyễn, CRD trên gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước uống

- **Gia cầm:** 1-2ml / 10kg TT
 - **Lợn, dê, cừu:** 1ml / 10kg TT
- Dùng từ 3-5 ngày.



Chai 20ml, 50ml

Toltrazuril (20ml) + Spectin-5% (50ml)

(Doxycyclin)

Đặc trị lợn con phân trắng, phân vàng.

Công dụng:

Đặc trị tiêu chảy phân trắng, phân vàng... do Ecoli, Salmonella... và cầu trùng Coccidios suis.

Hướng dẫn sử dụng:

Pha Toltrazuril (20ml) và Spectin-5% (50ml), lắc đều sau đó cho uống.

Liều dùng:

- **Lợn con:** 1-1,5ml/ con/ lần. Ngày hai lần
- **Lợn choai:** 2-3ml / 5kg TT / ngày.
- **Bê, nghé, dê, cừu:** 5ml / con / ngày.

Dùng từ 3-5 ngày.

Liều phòng: 3-5 giọt / lần

Sản phẩm Kháng sinh bột pha nước hoặc trộn thức ăn



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg, lon 1kg

Ampi - Colis

(Ampicillin, Colistin)

Đặc trị tụ huyết trùng, viêm ruột ỉa chảy, viêm phổi.

Công dụng:

- Gia cầm: Trị bệnh tụ huyết trùng, thương hàn, CRD, phân xanh, phân trắng, bệnh do E.coli, chóng điều khô chân...

- Gia súc: Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, bệnh ỉa chảy cấp, Lợn con phân trắng...

Hướng dẫn sử dụng:

- **Gia cầm:** 1g/ 3-5 kg TT/ ngày. Hoà với 0,5 lít nước cho uống. Hoặc trộn với thức ăn.

- **Gia súc:** 1g/ 5-8 kg TT/ ngày. Dùng liên tục từ 3-5 ngày bệnh sẽ khỏi.

* Liều phòng bằng ½ liều điều trị.



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Ampi - Colis (Gà rù, gà toi)

(Ampicillin, Colistin)

Đặc trị gà rù, gà toi, chóng điều khô chân, sã cánh, khô khè, mào thâm.

Công dụng:

- Điều trị hiệu quả những chứng bệnh ở gà rù, gà toi như chóng điều đầy hơi, mào thâm sã cánh, chân khô, thổ khô khè, mi mắt sưng, phù 2 bên đầu, phân xanh, phân trắng, phân vàng nhớt, ghép tụ huyết trùng.

- Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu: Trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm ruột ỉa chảy, thương hàn, Lợn con phân trắng.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- **Gia cầm:**

10g/ 30-50 kg TT/ ngày. Hoà với 5 lít nước cho uống.

- **Trâu, bò, Lợn, Dê, Cừu:** 10g/ 50-80 kg TT/ ngày.

Phòng bệnh hoặc úm vật nuôi nhỏ 10g/ 10-20 lít nước cho uống.

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Ecoli - ST4

(Sulfamethoxazol, Trimethoprim)

Đặc trị tiêu chảy, Ecoli sung phù đầu.

Công dụng:

- Gia cầm: Đặc trị viêm ruột, ỉa chảy do E.coli, phân xanh, phân trắng, tụ huyết trùng, thương hàn, mào thâm tím, chướng điều khô chân...
- Gia súc, chó, mèo: đặc trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, ho suyễn, tiêu chảy hồng lý, E.coli, thương hàn...

Hướng dẫn sử dụng:

- **Gia cầm:** 1g/10-15kg TT/ ngày. Hoặc 1g/ 1-2 lít nước
- **Lợn, chó, mèo:** 1g/ 10kg TT/ngày
- **Bê, dê, cừu:** 1g/ 10kg TT/ngày
Dùng từ 3-5 ngày



Túi 50g, 100g, 1kg, lon 1kg

Coli - 1002

(Colistin, Trimethoprim)

Đặc trị tụ huyết trùng, Ecoli sung phù đầu.

Công dụng:

- Gia súc: đặc trị tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy phân trắng, phân vàng nhớt, lẫn máu, viêm đường hô hấp, viêm màng não mủ, áp xe
- Gia cầm: đặc trị bệnh CRD, CCRD, ghép E.coli, ho thở khò khè, viêm xoang mũi truyền nhiễm, tụ huyết trùng, xù lông, sã cánh, coryza, đậu gà...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 1g/ 5-7 kg TT/ ngày. Hoặc 2g/ 1 lít nước uống.
- **Lợn, Bê, Dê, Cừu:** 1g/ 6-9 kg TT/ ngày.
Dùng liên tục từ 3-5 ngày
Phòng bệnh: dùng bằng 1/2 liều điều trị.



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Hen Gà - Suyễn Lợn

(Doxycyclin, Tylosin)

Đặc trị hen, suyễn, CRD, tiêu chảy.

Công dụng:

- Gia cầm: Đặc trị bệnh CRD, hen gà, khẹt Vịt, Ngan, Ngỗng. Bệnh tụ huyết trùng, ỉa phân xanh, phân trắng, bạch lý, bệnh do E.coli gây nên...
- Gia súc: Đặc trị bệnh suyễn lợn, thương hàn, viêm teo mũi, sung phù đầu, hội chứng tiêu chảy, bệnh hồng lý, E.coli, tụ huyết trùng, lợn con phân trắng.

Hướng dẫn sử dụng:

- Trị bệnh:
+ **Gia súc:** 1g/ 10kg TT/ ngày. Dùng từ 3-5 ngày
+ **Gia cầm:** 1g/5-7 kg TT/ ngày. Hoặc 1g/1 lít nước. Dùng từ 3-5 ngày.
- Phòng bệnh: bằng 1/2 liều điều trị.



Túi 50g, 100g, 1kg

Ofloquin

(Flumequin)

Đặc trị Ecoli, thương hàn, tụ huyết trùng.

Công dụng:

- Gia súc: Đặc trị viêm phổi, ho, suyễn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng máu, viêm tử cung, viêm khớp, viêm ruột ỉa chảy, đầy hơi, E.coli, phân xanh, phân trắng, phân nhớt vàng, thương hàn, Lợn con phân trắng...
- Gia cầm: Đặc trị tiêu chảy, phân xanh, phân trắng, chướng điều khô chân, tụ huyết trùng, CRD, E.coli, sung phù đầu và các bệnh ghép phức tạp khác

Hướng dẫn sử dụng:

- **Bê, Nghé, Dê, Cừu:** 1g/ 4-5 kg TT/ ngày
- **Lợn:** 1g/3-4 kg TT/ ngày. Dùng liên tục 3-5 ngày
- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 1g/ 5-6 kg TT/ ngày. Hoặc 1g/ 1-2 lít nước uống
- **Gà thịt:**
+ Dưới 2 tuần tuổi: 0,5g/ 1 lít nước uống
+ Trên 2 tuần tuổi: 1g/ 1 lít nước uống
- **Gà đẻ và gà trứng:**
+ Dưới 6 tuần tuổi: 0,5g/ 1 lít nước uống
+ Trên 6 tuần tuổi: 1g/ 1 lít nước uống



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Enro - 2000

(Enrofloxacin)

Đặc trị hen, CRD, tụ huyết trùng, thương hàn, Ecoli sung phù đầu.

Công dụng:

- Gia cầm: đặc trị hen gà, khạc vịt, tiêu chảy ghép E.coli, khó thở, khô khè, tụ huyết trùng biểu hiện mào thâm, sã cánh, chướng điều khô chan, rù toi, quay đầu, phân xanh, phân trắng...
- Gia súc: đặc trị viêm phổi, tụ huyết trùng, viêm ruột ỉa chảy nặng, E.coli sung phù đầu, viêm vú, viêm móng...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với thức ăn

- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 1g/ 8-10kg TT/ngày. Hoà với 2 lít nước uống. Hoặc trộn với 1kg thức ăn.
- **Lợn, chó, mèo:** 1g/10 kg TT/ ngày. Dùng từ 3-5 ngày.
- **Đê, cừu, bê, nghé:** 1g/ 15kg TT/ngày. Dùng từ 3-5 ngày.



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Trị Tiêu Chảy

(Neomycin, Colistin)

Đặc trị tiêu chảy, thương hàn, sung phù đầu.

Công dụng:

- Gia súc: Đặc trị viêm ruột tiêu chảy do E.coli gây ra, bệnh lợn con phân trắng, bệnh hồng ly, thương hàn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, đóng dấu...
- Gia cầm: Đặc trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, chướng điều khô chân, sốt cao, tụ huyết trùng...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với thức ăn

- **Lợn, Bê, Nghé, Đê, Cừu:** 1g/ 10-15 kg TT/ lần. Dùng liên tục 3-5 ngày. Phòng bệnh bằng 1/2 liều điều trị
- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 1g/ 6-8 kg TT/ ngày. Hoặc 1g/ 2 lít nước uống. Dùng từ 3-5 ngày.



Túi 100g, 1kg

Bromhexin - 100

(Bromhexin)

Giảm ho, long đờm, trợ hô hấp, thông khí quản

Công dụng:

Giảm tiết dịch nhày, giảm ho, long đờm, chống co thắt phế quản trong các trường hợp co thắt phế quản, viêm thanh khí quản truyền nhiễm, viêm phổi, hen, suyễn, CRD, CCRD, dị ứng thời tiết. Stress trong quá trình vận chuyển...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn

* **Gia cầm:** 1g/3-5 kg TT/ ngày. Hoặc 2g/1 lít nước cho uống.
* **Lợn, Chó, Mèo:** 1g/20 kg TT/ ngày.
* **Đê, Cừu, Bê, Nghé:** 1g/25 kg TT/ngày. Dùng từ 3-10 ngày. Hoặc 1g trộn với 1kg thức ăn, dùng 3-5 ngày.
* **Chú ý:** nên dùng kết hợp với kháng sinh trong điều trị bệnh hen suyễn, viêm đường hô hấp.



Túi 50g, 100g, 1kg

Amoxil - 100

(Amoxicillin)

Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, tụ huyết trùng, Ecoli, bạch ly

Công dụng:

- Gà, Vịt, Ngan, Chim Cút: Đặc trị bệnh viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân sấp, phân lẫn máu, phân nhớt vàng, khô chân, bạch ly, tụ huyết trùng, viêm phổi, CRD, viêm buồng trứng ở Gà Vịt đẻ...
- Lợn, Đê, Bê, Nghé, Cừu, Chó, Mèo: Đặc trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy cấp và mãn tính, viêm khớp, viêm da và mô mềm...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn thức ăn

- Liều phòng:
* **Gà, Vịt, Ngan, Chim cút:** 1g/10 kg TT/ ngày. Hoà với 1 lít nước cho uống. Dùng từ 3-5 ngày.
* **Lợn, Đê, Bê, Nghé, Cừu, Chó, Mèo:** Liều chung: 1g/8-10 kg TT/ ngày. Dùng từ 3-5 ngày.
- Liều điều trị: gấp 2 lần liều phòng

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Úm Gia cầm

(Oxytetracyclin, acid amin, vitamin)
Hiệu quả cao trong úm gia cầm.

Công dụng:

Dùng cho Gà, Vịt trong giai đoạn úm. Ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, tụ huyết trùng, CRD. Bệnh đường tiêu hoá, trĩ tiêu chảy, phân trắng, thương hàn, E.coli. Kích thích tiêu hoá, tăng trọng lớn nhanh, tăng sức đề kháng...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn.
1g trộn với 0,5 kg thức ăn hoặc hoà với 1 lít nước cho uống.
Dùng liên tục trong thời kỳ úm gia cầm.



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

CRD-Genotic

(Gentamycin, Tylosin)

Đặc trị hen gà, khèc vịt, suyễn lợn, CRD, viêm phổi

Công dụng:

- Đặc trị hen gà, khèc vịt, CRD, E.coli sung phù đầu, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, tụ huyết trùng, thương hàn... ở gà, vịt.
- Trị viêm phổi, hen, suyễn, tụ huyết trùng, phó thương hàn, Ecoli sung phù đầu, tiêu chảy nặng, phân vàng, phân nhớt, phân có máu... ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Gà, Chim Cút:** 1g/4-5 kg TT/ ngày. Dùng từ 3-5 ngày
- **Vịt, Ngan, Ngỗng:** 1g/4-5 kg TT/ ngày. Dùng từ 3-5 ngày.
Hoặc 10g hoà với 1 lít nước cho uống, Dùng từ 3-5 ngày
Liều phòng bằng ½ liều điều trị
- **Lợn, bê, nghé, dê, cừu:** 1g/8-10 kg TT/ ngày. Hoặc 10g trộn với 5 kg thức ăn hỗn hợp. Dùng từ 3-5 ngày.



Túi 10g, 100g, 1kg

Oxytetra-Sul

(Oxytetracyclin, Sulfadimidin)

Đặc trị tiêu chảy, tụ huyết trùng, viêm phổi, Lepto

Công dụng:

Phòng và trị các hội chứng tiêu chảy, bệnh hồng lỵ, E.coli, viêm phổi, viêm phế quản, tụ huyết trùng, bệnh lepto, bệnh cầu trùng ở Thỏ, bệnh phân xanh, phân trắng, chướng điều khô chân, bệnh đậu ở gà...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Gia cầm:** 10g/ 30 kg TT/ ngày.
Hoặc 10g/ 10 lít nước cho uống.
- **Gia súc:** 10g/ 30-50 kg TT/ ngày.
Liều phòng bằng ½ liều chữa.



Túi 50g, 100g, 1kg

Kháng sinh Ngan - Vịt

(Norfloxacin, vitamin)

Đặc trị tụ huyết trùng, Ecoli phù đầu, viêm phổi

Công dụng:

Đặc trị Ngan, Vịt có triệu chứng ủ rũ bỏ ăn, bệnh viêm phổi, CRD, bệnh khèc Ngan, Vịt, kéo màng mắt, tụ huyết trùng, triệu chứng thần kinh quay đầu biểu hiện cả đàn chết nhanh. Trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, E.coli, bệnh thương hàn...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn.
1g/5-8 kg TT trộn với 1 kg thức ăn hoặc 1g hoà với 1 lít nước cho uống.
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.
Liều phòng: 1g hoà với 2 lít nước cho uống hàng ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg, lon 1kg

Meta-Kazol

(Flumequin, acid amin, vitamin)

Đặc trị Gum gà, dịch vịt.

Công dụng:

- Gà: Đặc trị bệnh Gumboro, sốt cao, chướng điều đầy hơi, khô chân, CRD, phân xanh, phân trắng, bệnh cầu trùng
- Ngan, Vịt, Ngỗng: Đặc trị phân xanh, phân trắng, ủ rũ, bỏ ăn, kéo màng mắt, quay đầu, khếch Vịt, cả đàn chết nhanh...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn Gà, Vịt, Ngan, Ngỗng:
1g/ 3 kg TT/ ngày hoặc 1g / 1 lít nước cho uống. Dùng liên tục 3-5 ngày.



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Doxy-Tylo

(Doxycyclin, Tylosin)

Đặc trị hen gà, khếch vịt, suyễn lợn

Công dụng:

Đặc trị bệnh hen Gà, khếch Vịt, viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, bệnh suyễn Lợn, tụ huyết trùng, E.coli, sung phù đầu, Lợn con phân trắng, chướng điều khô chân ở Gà, Vịt...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Lợn, Dê, Cừu, Bê, Nghé:**
1g / 20 kg TT/ ngày. Ngày dùng 2 lần
- **Gia cầm:** 1g / 10-15 kg TT/ ngày. Hoà với 1 lít nước cho uống. Dùng liên tục 3-5 ngày



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Thiamphenicol-10%

(Thiamphenicol)

Đặc trị thương hàn, bạch lỵ, Ecoli phù đầu

Công dụng:

- Gia cầm: Đặc trị thương hàn, E.coli, ỉa chảy phân xanh, phân trắng, Ecoli sung phù đầu, hen, khếch, chóng ủ rũ, bại liệt, sã cánh, chóng điều, bỏ ăn, tụ huyết trùng...
- Gia súc: Đặc trị thương hàn, E.coli, viêm ruột ỉa chảy, liên cầu khuẩn, tụ huyết trùng, bệnh đóng dấu, viêm vú, viêm tử cung. Dùng trong điều trị bệnh nhiễm trùng kể phát sốt đỏ tai xanh ở lợn

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
- **Gia cầm:** 1g/8-10 kg TT/ ngày. Hoặc 2g/ 1 lít nước uống.
- **Bê, Nghé:** 1g/ 15-20 kg TT/ ngày. Dùng liên tục từ 3-5 ngày.
- **Lợn, Dê, Cừu:** 1g/10-15 kg TT/ ngày. Dùng 3 ngày.



Túi 50g, 100g, 1kg

Tri-Colis

(Trimethoprim, Polymycin)

Đặc trị Thương hàn, E.coli, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng

Công dụng:

- Gia súc và heo: Đặc trị các bệnh viêm ruột, tiêu chảy cấp, tiêu chảy do E.coli, bệnh thương hàn, phó thương hàn do Salmonella, bệnh lợn con phân trắng, phân vàng, phân nhớt...
- Gia cầm: trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, ủ rũ, bỏ ăn, chóng điều khô chân, sốt cao, tụ huyết trùng...
- Đặc biệt kết hợp với than hoạt tính làm tăng tác dụng hấp phụ độc tính trong các bệnh tiêu chảy.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn. Dùng từ 3-5 ngày.
* **Liều điều trị:**
- **Gà, vịt, cút, bồ câu:** 2g/1 lít nước uống. Hoặc 1kg/250-300kg thức ăn
- **Gia súc:** 1kg/200-300kg thức ăn
* **Liều phòng:** bằng ½ liều điều trị

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Flor-400 (Dạng bột hòa tan)

(Flophenicol)

Phòng và trị bệnh viêm phổi, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, thương hàn, E.coli, tiêu chảy, bệnh ghé, nhiễm trùng kế phát tai xanh

Công dụng:

* Gia cầm và thủy cầm: Phòng và trị các bệnh đường tiêu hóa do Salmonella (thương hàn), E.coli, Clostridium (viêm ruột hoại tử), tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng... Trị viêm đường hô hấp do Mycoplasma (CRD) gây hen khè, sung phù mắt, Pasteurella (tụ huyết trùng), Coryza...

* Gia súc và heo:

- Phòng và trị viêm hô hấp phức hợp nhu viêm phổi, viêm phổi dính sườn, suyễn, viêm teo mũi
- Phòng và trị bệnh tiêu chảy, thương hàn, E.coli, viêm ruột hoại tử...
- Phòng và trị bệnh kế phát tai xanh, ốm không rõ nguyên nhân...

Hướng dẫn sử dụng:

- **Liều điều trị:**

+ Gà, vịt, ngan, cút:
1g/2 lít nước.

Hoặc 1kg/450kg thức ăn

+ Lợn con, lợn nái, lợn thịt:

10g/25-30kg TT/ngày

Hoặc 1kg/500kg thức ăn.

Dùng liên tục 3-5 ngày

- **Liều phòng:** bằng 1/2 liều điều trị.
Định kỳ cách nhau 7-10 ngày.



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Flor-400 (Dạng bột trộn thức ăn)

(Flophenicol)

Phòng và trị bệnh viêm phổi, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, thương hàn, E.coli, tiêu chảy, bệnh ghé, nhiễm trùng kế phát tai xanh

Công dụng:

* Gia cầm và thủy cầm: Phòng và trị các bệnh đường tiêu hóa do Salmonella (thương hàn), E.coli, Clostridium (viêm ruột hoại tử), tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng... Trị viêm đường hô hấp do Mycoplasma (CRD) gây hen khè, sung phù mắt, Pasteurella (tụ huyết trùng), Coryza...

* Gia súc và heo:

- Phòng và trị viêm hô hấp phức hợp nhu viêm phổi, viêm phổi dính sườn, suyễn, viêm teo mũi
- Phòng và trị bệnh tiêu chảy, thương hàn, E.coli, viêm ruột hoại tử...
- Phòng và trị bệnh kế phát tai xanh, ốm không rõ nguyên nhân...

Hướng dẫn sử dụng:

* **Gia cầm và thủy cầm:**

- Phòng bệnh:

Trộn với thức ăn, dùng mỗi đợt từ 5-7 ngày, nghỉ 7 ngày, dùng lại với liều 100g / 100-150kg thức ăn

- Trị bệnh: dùng gấp 2-3 lần liều phòng

* **Gia súc và heo:**

- Phòng bệnh: 100g/ 150-200kg thức ăn

- Điều trị: dùng gấp 2-3 lần liều phòng

- Heo nái: 5-10g / con / ngày. Cho ăn trước và sau khi đẻ 1 tuần.

Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ từ 5-7 ngày.



Túi 100g, 1kg

Timicos-200

(Tilmicosin)

Đặc trị CRD ghé E.coli, hen suyễn

Công dụng:

- Gia cầm: Đặc trị CRD ghé E.coli, hen gà, khè vịt, viêm xoang, viêm thanh quản, vảy mỏ, viêm đường hô hấp cấp và mạn tính...
- Gia súc: Đặc trị suyễn lợn, hội chứng ho thở, viêm phổi, viêm phổi dính sườn, khó thở, thở đóc.

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước uống, trộn với thức ăn

- **Gia cầm:** 1g/8-10 kg TT. Hoặc 1g hoà với 2 lít nước uống.

- **Gia súc:** 1g/20 kg TT/ ngày. Hoặc 1g trộn với 5 kg thức ăn.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Hen Vịt - Tụ Huyết Trùng

(Tylosin, Tetracyclin)

Đặc trị khêc vịt, hen gà, tụ huyết trùng.

Công dụng:

Trị bệnh hen ở gà, vịt, tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản truyền nhiễm, bệnh CRD, CCRD, bệnh quay đầu vịt, viêm ruột, ỉa chảy, E.coli, phân xanh, phân trắng, chướng điều khô chân, biểu hiện cả đàn chết nhanh...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
Gà, Vịt, Ngan, Cút:
1g/ 3-5 kg TT/ ngày.
Hoặc 1g/ 0,5 lít nước uống. Dùng liên tục từ 3-5 ngày.



Túi 10g, 100g, 1kg

Amo - Coliforte

(Amoxicillin, Colistin)

Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, tụ huyết trùng, Ecolin

Công dụng:

Đặc trị viêm ruột hoại tử, viêm phổi, nhiễm trùng cấp, tụ huyết trùng, tiêu chảy, E.coli, bạch lý.

- Gia cầm: Đặc trị bệnh do vi khuẩn yếm khí CL-perfringens gây viêm ruột hoại tử, tiêu chảy phân sấp, phân lẫn máu, phân nhớt vàng, khô chân, bạch lý, tụ huyết trùng, CRD, viêm buồng trứng ở gà, vịt đẻ...

- Gia súc: đặc trị tụ huyết trùng, viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy cấp và mãn tính, thương hàn, phân trắng lợn con do E.coli... Phòng ho thỏ ở lợn.

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn.

- **Gia cầm:** 1g/15-20 kg TT. Hoặc 1g/1-2lít nước. Dùng từ 3-5 ngày.

- **Lợn, Bè, Nghé:**
1g/20 kg TT/lần.
Ngày 2 lần. Dùng từ 3-5 ngày.



Túi 10g, 100g, 1kg

Ampicolis- Forte

(Ampicillin, Colistin)

Đặc trị viêm đường hô hấp, tiêu hóa, tụ huyết trùng

Công dụng:

- Đặc trị tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng, viêm ruột hoại tử do Salmonella, E.coli, Clostridium.

- Bệnh tụ liên cầu, bệnh tụ huyết trùng.

- Bệnh CRD, CCRD do Mycoplasma gây nên.

- Viêm phổi dính sườn ở lợn

- Kết hợp với thuốc cầu trùng để tăng hiệu quả điều trị bệnh

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- **Gia cầm:**
1g/2 lít nước hoặc 1g/10 kg TT.

- **Gia súc:**
1g/1 lít nước hoặc 1g/20 kg TT.
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.



Túi 100g, 1kg

Apramycin - 45%

(Apramycin)

Đặc trị Ecolin kéo màng, thương hàn, tụ huyết trùng

Công dụng:

- Gà, Vịt, Ngan, Cút: Đặc trị Ecolin kéo màng, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, thương hàn, bạch lý, sung phù đầu, tụ huyết trùng...

- Lợn: Trị tiêu chảy, bệnh ỉa phân trắng do E.coli, viêm ruột hoại tử, sung phù đầu, nhiễm trùng máu.

- Bè, Nghé, dê, cừu: Trị bệnh viêm ruột, thương hàn, tiêu chảy, kiết lý, chướng bụng đầy hơi.

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn

- **Gia cầm:** 1g/10-15kg TT/ ngày hoặc 1g/2-3 lít nước uống. Dùng từ 3-5 ngày.

- **Lợn, Bè, Nghé, Dê, Cừu:**
1g/20-25 kg TT/ ngày.
Dùng từ 3-5 ngày.

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 50g, 100g, 1kg

Doxy - 500 (Dạng bột hòa tan)

(Doxycyclin)

Đặc trị CRD, hen ghép E.coli, tiêu chảy, viêm phổi dính sườn

Công dụng:

- Gia cầm: Đặc trị CRD, hen nặng, sung phù đầu, khó thở ghép E.coli kết hợp CCRD, hen ghép tiêu chảy, Coryza, bạch ly, thương hàn...
- Gia súc: Đặc trị viêm phổi do Mycoplasma gây ra ho kéo dài lâu ngày, viêm phế quản, viêm phổi dính sườn, tụ huyết trùng, hồng ly, lepto...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
+ Trị bệnh:
- **Gia cầm:** 1g/4 lít nước.
Hoặc 1g/40-45kg TT. Dùng từ 3-5 ngày.
- **Gia súc:** 1g/50 kg TT. Hoặc 1g/5-10 lít nước. Dùng từ 3-5 ngày.
+ Liều phòng bằng ½ liều điều trị.



Túi 1kg

Spytrim

(Spiramycin, Trimethoprim)

Đặc trị CRD, hen ghép E.coli, viêm phổi, ho suyễn

Công dụng:

- Đặc trị: Hen, khêc do viêm phổi, viêm phế quản tắc nghẽn, OLT, CRD, viêm xoang, sung đầu, phù mắt, Coryza, chảy nước mắt, nước mũi, bệnh ghép E.coli kéo màng...ở gia cầm. Hen ngáp, khó thở, ho suyễn ở gia súc và lợn.
- Tiêu chảy phân xanh, phân trắng

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn. Dùng từ 5-7 ngày.
- **Gà, vịt, ngan, cút:** 1g/6kg TT/ngày
Hoặc 1g/1 lít nước
- **Lợn:** 1g/10kg TT/ngày



Túi 100g, 1kg

S.F.M.N. Methoxine

(Sulfamono methoxin)

Đặc trị bệnh ký sinh trùng đường máu, viêm ruột, đầu đen

Công dụng:

Đặc trị bệnh ký sinh trùng đường máu, gây sốt cao, máu loãng, đầu sưng, mào thâm, đầu đen, xù lông sã cánh, viêm ruột tiêu chảy phân loãng, phân xanh, phân trắng, gan sưng, gan hoa, mặt cổ lỗ chỗ màu trắng, ruột chứa chất nhớt hồng, lẫn máu do ký sinh trùng tạo thành ổ kén trong ruột.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn thức ăn
* **Gia cầm:** 1g/20-30 kg TT/ ngày hoặc 1g/4-6 lít nước.
Dùng từ 3-5 ngày.
* **Gia súc:** 1g/40-45 kg TT/ ngày.
Liều phòng bằng ½ liều điều trị.



Túi 100g, 1kg

PION - APRACIN 10%

(Apramycin)

Đặc trị E.coli kéo màng, tiêu chảy, kiết lỵ, thương hàn, tụ huyết trùng.

Công dụng:

- **Gà, vịt, ngan, cút:** Đặc trị bệnh E.coli kéo màng, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, bạch ly, thương hàn, sung phù đầu, tụ huyết trùng, chướng điều khô chân
- **Gia súc và lợn:** Đặc trị tiêu chảy, bệnh ỉa phân trắng do E.coli, kiết lỵ, viêm ruột hoại tử, sung phù đầu, nhiễm trùng máu.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn thức ăn. Dùng từ 3-5 ngày.
- **Gia cầm:**
1g / 5-8kg TT / ngày hoặc 1g / 1 lít nước
- **Lợn, bê, nghé, dê, cừu:**
1g / 10-15kg TT / ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 08 ngày.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm kháng sinh bột Pha nước hoặc trộn thức ăn



Lon 1kg

Kyta-Flor

(Kytasamycin, Florfenicol)

Đặc trị hen gà, khêc vịt, CRD, viêm phổi tắc nghẽn kéo ken...

Công dụng:

-- Đặc trị viêm phổi, viêm phế quản, khí quản gây tắc nghẽn, kéo kén, kéo màng
- Đặc trị hen, khêc do CRD, CCRD, OLT, ORT, sung phù đầu, Coryza gây viêm xoang mắt, chảy nước mắt, nước mũi, khó chữa...
- Đặc trị phân xanh, phân trắng do E.coli, Salmonella...
- Lợn và đại gia súc: đặc trị viêm đường hô hấp, viêm phổi, ho suyễn, viêm ruột hoại tử, thương hàn, kiết lỵ, tiêu chảy phân trắng, phân vàng...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn. Dùng từ 3-5 ngày.

*** Liều điều trị:**

- **Gia cầm:** 1g/2-3 lít nước uống. Hoặc 1g/10-15kg TT/ngày.
- **Lợn và đại gia súc:** 1g/15-30kg TT/ngày. Hoặc 1g/2-3kg thức ăn
*** Liều phòng:** bằng ½ liều điều trị
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 07 ngày.



Lon 1kg

Amox-Col

(Amoxicillin, Colistin)

Đặc trị viêm phổi, CRD, tụ huyết trùng, E.coli sung phù đầu, tiêu chảy phân xanh, phân trắng

Công dụng:

- **Gia cầm:** Đặc trị bệnh do VK yếm khí Clostridium gây viêm ruột hoại tử, bệnh thương hàn do Salmonella gây tiêu chảy cấp tính, viêm xoang mũi Coryza, phân nhớt vàng, phân xanh, phân trắng...
- **Gia súc và lợn:** đặc trị viêm phổi, ho, suyễn, tụ huyết trùng, đóng dấu, tiêu chảy cấp... Phòng và hỗ trợ điều trị tai xanh ở lợn

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn. Dùng từ 3-5 ngày.
- **Gà, vịt, ngan, cút, bồ câu:** 1g/40-60kg TT/ngày Hoặc 1g/5-7 lít nước
- **Lợn, trâu, bò, dê, cừu:** 1g/50-70kg TT/ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 5-7 ngày



Lon 1kg

Amox-500

(Amoxicillin)

Đặc trị viêm ruột hoại tử, tụ huyết trùng, thương hàn, E.coli, bạch lỵ, viêm phổi, CRD

Công dụng:

- Đặc trị viêm ruột hoại tử, phân xanh, phân trắng, phân sấp, lẫn máu, Ecoli.
- Trị viêm phổi, viêm phế quản, CRD, nhiễm trùng cấp...
- Phòng và trị bệnh thương hàn do Salmonella, viêm buồng trứng, viêm ống dẫn trứng gây đẻ non, trứng méo mó trên gia cầm
- Trị viêm móng, viêm vú, viêm tử cung trên lợn và đại gia súc
- Phòng và hỗ trợ điều trị bệnh tai xanh (PRRS) ở lợn

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn. Dùng từ 3-5 ngày.
- **Gà, vịt, ngan, cút, bồ câu:** 1g/25-30kg TT/ngày Hoặc 1g/4-5 lít nước
- **Lợn, trâu, bò, dê, cừu:** 1g/40-50kg TT/ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 5-7 ngày



Túi 10g, 100g, 1kg

Namax

(Natri sulfate, Natri nitrat, Magiechloride)

Điều trị đầy hơi gia súc

Công dụng:

Đặc trị sinh bụng, đầy hơi, nóng rít thực quản, dạ dày, giảm phù não, kích thích tiêu hoá, bù điện giải, chống mất nước, chống táo bón cho gia súc...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
*** Lợn, Trâu, Bò:** 10g/ 50-100 kg TT/ ngày
*** Chó, Mèo:** 10/ 15-30 kg TT/ ngày
Dùng liên tục 2-3 ngày

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 20ml, 100ml

Vitamin B.Complex

(Canci, các vitamin nhóm B)

Phòng và trị các bệnh do thiếu vitamin nhóm B, kích thích thèm ăn

Công dụng:

Bổ sung các nhóm Vitamin nhóm B cho cơ thể, tăng cường sự trao đổi chất, phòng chống Stress, chống còi xương, chậm lớn, kích thích tiêu hoá...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp
- **Gia súc:** dùng 3-6 ml/50 kg TT
- **Gia cầm:** dùng 1 ml/ 3 kg TT
Dùng liên tục từ 3-5 ngày.



Chai 20ml, 100ml

AD₃E - Bcomplex

(Vitamin A, D, E, nhóm B)

Tăng năng suất sinh sản. Tăng rụng trứng, sinh tinh. Heo nái nhiều con

Công dụng:

- Cung cấp vitamin nhóm ADE, B hàm lượng cao, tăng năng suất chăn nuôi.
- Gia súc: Bò, ngựa cái, heo nái kích thích rụng trứng nhiều, tỷ lệ đậu thai cao, phòng sảy thai, chết thai ở heo
- Chống vô sinh do giảm chức năng buồng trứng ở gia súc.
- Bò, ngựa, heo đực giống tăng khả năng sinh tinh, tăng tinh hăng tinh đục, giảm tinh trùng kỳ hình
- Nâng sức đề kháng, tăng chuyển hóa và hấp thu dưỡng chất, phòng chống bệnh còi xương, mềm xương ở gia súc non và gia súc trưởng thành...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da
- **Lợn nái, đực giống:** 4-5ml/ con
- **Bò, ngựa cái, đực giống:** 5ml/ con
- **Bê, nghé, dê, cừu:** 3ml/ con
- **Lợn con, chó, mèo:** 0,5-1ml/ con



Chai 100ml

Vitamin B1 - 2,5%

(Thiamin)

Phòng thiếu vitamin B1, phòng chống bại liệt

Công dụng:

Phòng chống bệnh thiếu Vitamin nhóm B, bệnh tê, phù, kém ăn, bệnh bại liệt, viêm dây thần kinh, kích thích tiêu hoá...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da, hoặc hòa vào nước cho uống
- **Trâu, Bò, Bê, Nghé:** 1 ml / 10-20 kg TT
- **Lợn, Dê, Cừu:** 1 ml / 5-10 kg TT
- **Gia cầm:** 1 ml / 5 kg TT



Chai 100ml

Vitamin C - 5%

(Vitamin C)

Phòng chống Stress, tăng sức đề kháng

Công dụng:

- Phòng bệnh thiếu Vitamin C gây chảy máu, phòng chống Stress, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, tăng cường hiệu quả các bệnh truyền nhiễm khi kết hợp với kháng sinh.
- Phòng chống Stress khi thay đổi môi trường

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp
- **Trâu, Bò, Bê, Nghé:** 1 ml/ 8-10 kg TT/ ngày
- **Lợn:** 1 ml/10 kg TT/ ngày
- **Gà, Vịt:** 1 ml/ 5-7 kg TT/ngày
Hoặc hoà vào nước cho uống.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYỄN JSC

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực



Chai 100ml

Vitamin K3

(Vitamin K3)

Thuốc cầm máu

Công dụng:

Phòng và trị bệnh chảy máu trong các bệnh gây xuất huyết, bệnh cầu trùng ghép ở gà, vịt, bệnh xuất huyết tiêu hoá, ỉa ra máu tươi. Bệnh dung huyết, E.coli, phù đầu...

Hướng dẫn sử dụng:

- **Gia cầm:**

Trị bệnh: 1-2 ml hoà với 1 ml nước cho uống trong 3 ngày
Phòng bệnh: 2 ml hoà với 2 lít nước cho uống trong 8 ngày.

- **Gia súc:** Tiêm bắp 1 ml/ 20 kg TT/ ngày. Dùng trong 3 ngày.



Chai 20ml, 100ml

Butasal - B12

(Butafosfan, vitamin B12)

Điều trị bệnh hậu sản, bại liệt, sốt sữa, vô sinh. Tăng khả năng sinh sản. Tăng sức đề kháng, phòng chống còi cọc, suy dinh dưỡng.

Công dụng:

- Tăng cường quá trình trao đổi chất giúp vật nuôi ốm tỉnh nhanh, mau khỏe lại.

- Giảm tối đa hiện tượng sốc khi dùng vaccin ở lợn (tránh triệt để hiện tượng sau khi dùng vaccin lợn ốm không chữa được).

- Bổ sung phospho hữu cơ giúp quá trình hấp thu khoáng cho lợn con. Chống bệnh còi xương, xóp xương, liệt ở lợn con. Giúp lợn con tăng trọng nhanh, giảm thiểu tiêu chảy.

- Lợn nái khỏe, đẻ nhanh (giảm viêm tử cung), tiết sữa nhiều.

Hướng dẫn sử dụng:

- Tiêm bắp, tiêm dưới da

* **Ngựa:** 5-25 ml/ con

* **Bê, Nghé:** 5-12 ml/ con

* **Đê, Cừu:** 2-5 ml/ con

* **Đê, Cừu non:** 1,5-2,5 ml/ con

* **Lợn:** 2,5-10 ml/ con

* **Lợn con:** 1-2,5 ml/ con

* **Chó, Mèo:** 0,5-5 ml/ con

* **Gia cầm:** 1 ml/ con

Tiêm nhắc lại sau 3 ngày, bệnh mạn tính dùng ½ liều trong 1-2 tuần.

- Có thể dùng cho uống với liều

* **Gia súc non:** 5-10 ml/con

* **Gia súc trưởng thành:** 15-30 ml/ con

* **Gia cầm:** 10 ml/2 lít nước uống/ 20kg TT



Chai 20ml, 100ml

B12 - Ferridextran

(Ferridextran, vitamin B12)

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt

Công dụng:

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở gia súc sơ sinh, tăng tạo hồng cầu, phòng bệnh lợn con phân trắng...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Lợn con (2-3 ngày tuổi):**

1-2 ml/con. Tiêm nhắc lại sau 1 tuần tuổi.

- **Lợn nái:** 3-5 ml/con. Tiêm trước ngày đẻ từ 2-3 tuần

- **Đê, Bê, Nghé:** 4-10 ml/con

- **Chó, mèo:** 2-4ml/con

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 10ml, 20ml, 100ml

B12-Ferridex 10%

(Ferridextran, vitamin B12)

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt

Công dụng:

- Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở gia súc sơ sinh, tăng sự tái tạo hồng cầu. Chống còi xương, suy dinh dưỡng.
- Trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt biểu hiện da nhợt nhạt, thờ đốc, kèm tiêu chảy, còi cọc, xù lông ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp thịt

- **Lợn con (2-3 ngày tuổi):** 1-2 ml/ con. Tiêm nhắc lại sau 1 tuần.
- **Lợn nái:** 2-3 ml/con. Tiêm trước ngày đẻ từ 2-3 tuần
- **Đê, Bê, Nghé:** 2-4 ml/con
Liều phòng bằng ½ liều điều trị.



Chai 10ml, 20ml, 100ml

B12-Ferridex 20%

(Ferridextran, vitamin B12)

Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt

Công dụng:

- Phòng và trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở gia súc sơ sinh, tăng sự tái tạo hồng cầu. Chống còi xương, suy dinh dưỡng.
- Trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt biểu hiện da nhợt nhạt, thờ đốc, kèm tiêu chảy, còi cọc, xù lông ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Lợn con (2-3 ngày tuổi):** 0,5 ml/ con. Tiêm nhắc lại sau 1 tuần.
- **Lợn nái:** 1-1,5 ml/con. Tiêm trước ngày đẻ từ 2-3 tuần
- **Đê, Bê, Nghé:** 1-2 ml/con
Liều phòng bằng ½ liều điều trị



Chai 500ml, 1lit

Butasal - B12

(Butafosfan, vitamin B12)

Tăng khả năng sinh sản, phục hồi sức khỏe nhanh

Công dụng:

- Điều trị các rối loạn chuyển hoá cấp và mạn tính, kích thích trao đổi chất, tăng trọng lớn nhanh. Hỗ trợ điều trị mắc các bệnh ghép, E.coli, CRD, tai xanh.
- Tăng cường khả năng sinh sản, bệnh hậu sản, phòng sốt sữa, bại liệt sau khi sinh
- Điều trị các trường hợp kiệt sức, giảm sức đề kháng, suy nhược, bệnh thiếu máu, phục hồi sức khoẻ nhanh sau khi bị bệnh...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống

- **Gia súc non:** 5-10 ml/con. Hoà với 1 lít nước cho uống
- **Gia súc trưởng thành:** 15 ml- 30ml/con
- **Gia cầm:** 10 ml/20 kg TT. Hoà với 2 lít nước uống.



Chai 500ml, 1lit

Hepavit

(Sorbitol, các vitamin, acid amin)

Giải độc gan, thận - Lợi mật - Tăng khả năng tiêu hóa thức ăn

Công dụng:

- Bổ gan, cải thiện chức năng gan, tăng khả năng giải độc gan khi bị nhiễm độc tố do thức ăn hoặc hóa chất, kháng sinh dài ngày.
- Lợi mật, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu chất béo giúp nâng cao năng suất.
- Nâng cao sức đề kháng cơ thể, phòng bệnh thiếu vitamin nhóm B. Kích thích thèm ăn, chống còi xương, suy dinh dưỡng, tăng tỷ lệ đẻ trứng ở gia cầm...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà vào nước cho uống.

Liều chung: 1- 2ml/ 1 lít nước/ ngày.

* **Gà, Vịt, Ngan, Cút:**

1-2 ml/ 1 lít nước/ ngày.

* **Lợn, Đê, Cừu:** 3 - 5 ml/ con/ ngày

* **Bê, Nghé, Ngựa:** 5 - 10ml/ con/ ngày

* **Chó, Mèo:** 1 - 2 ml/ con/ ngày



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực



Chai 500ml, 1lit

Sorbitol -B12

(Sorbitol, vitamin B12)

Giải độc gan, lợi mật, chống táo bón, tăng hấp thu canxi, chống còi xương

Công dụng:

- Giải độc gan, loại bỏ các sản phẩm độc hại qua đường tiêu hóa khi bị nhiễm độc thức ăn, bệnh nhiễm trùng, sử dụng kháng sinh lâu ngày, gan teo, hấp thụ thức ăn kém.
- Tăng khả năng tiết mật nhằm kích thích tiêu hóa, nhuận tràng, chống táo bón, ăn không tiêu, tăng khả năng chuyển hóa và khả năng hấp thụ canxi, chống còi xương, chậm lớn.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước cho uống
- **Gia súc, ngựa:** 1ml / 20kg TT, dùng từ 5-7 ngày
 - **Bê, nghé, dê, cừu:** 1ml / 10kg TT, dùng từ 5-7 ngày
 - **Gia cầm, lợn:** 1ml / 2-4 lít nước, dùng từ 5-7 ngày



Chai 100ml, 1000ml

Canxi - Polyvit

(Các vitamin và khoáng chất)

Kích đẻ nhiều, tăng tái tạo vỏ trứng, ngừa bại liệt, còi xương, suy dinh dưỡng.

Công dụng:

- Kích đẻ nhiều, tăng tái tạo vỏ trứng, ngừa bại liệt, bại chân, yếu chân, cung cấp khoáng và canxi thiết yếu cho sự phát triển xương ở gia súc
- Phòng chống còi xương, suy dinh dưỡng, mổ cắn nhau ở gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước hoặc cho uống trực tiếp
- Gia cầm: 1ml / 3-5kg TT
 - Gia súc: 1ml / 4-5kg TT
- Phòng còi xương: dùng 7-10 ngày / tháng



Chai 100ml, 1000ml

Canxi - D3

(Ca, vitamin D3, Mg)

Tăng hấp thu canxi, phòng bại liệt, còi xương, giúp tái tạo vỏ trứng.

Công dụng:

- Tăng hấp thu canxi trong những trường hợp bị còi xương, xương yếu, tăng khả năng miễn dịch
- Cung cấp khoáng và canxi thiết yếu cho sự phát triển của vỏ trứng ở gia cầm, xương ở gia súc

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước cho uống
- Gà đẻ: 1ml / 1 lít nước
 - Gà thịt: 1-2ml / 1 lít nước
 - Lợn, bê, dê, cừu: 10ml / 5 lít nước
- Dùng liên tục trong thời gian nuôi.



Túi 100g, 1kg

Vitamin - B.Complex

(Các Vitamin nhóm B)

Bổ dưỡng tăng lực. Ăn khỏe chóng lớn. Giảm tiêu tốn cam. Trợ sức, trợ lực, chống còi xương.

Công dụng:

- Phòng và điều trị bệnh thiếu vitamin nhóm B gây bệnh tê, phù, bại liệt, còi xương, chậm lớn, rối loạn chuyển hóa, rối loạn trao đổi chất...
- Tăng sức đề kháng, duy trì sức khỏe vật nuôi
- Kích thích tiêu hóa, ăn nhiều lớn nhanh, giảm tiêu tốn thức ăn...

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Gia súc:** 1g / 10-15kg TT / ngày
 - **Gia cầm:** 1g / 15kg TT / ngày, hoặc pha với 3 lít nước uống, hoặc trộn với 1,5kg thức ăn hỗn hợp.
- Dùng liên tục trong thời gian nuôi.

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Gói 500g, 1kg, lon 1kg

Đạm Sữa - 03

(Các vitamin và khoáng chất)

Đạm sữa - Kích sữa heo nái

Công dụng:

- ĐS-03 sử dụng cho lợn nái đang mang thai, cho con bú và lợn con, sản phẩm có chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết như các vitamin, khoáng đa vi lượng, các acid amin, kích thích thèm ăn, tránh còi cọc, phòng ngừa suy dinh dưỡng
- Tăng sức đề kháng, ngừa thiếu máu, tiêu chảy ở lợn con.

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn thức ăn

* **Lợn nái:** trộn 1kg với 50-100 kg thức ăn. Cho ăn từ 2 tháng trước khi nái đẻ và tiếp tục cho ăn trong suốt thời gian nuôi con.

* **Lợn hậu bị:** trộn 1kg với 20-40 kg thức ăn.

* **Lợn cai sữa đến 70 ngày tuổi:** trộn 1kg với 25-30 kg thức ăn



Túi 100g, 1kg

Vitamin K - 10%

(Vitamin K3)

Thuốc cầm máu.

Công dụng:

Thuốc có tác dụng cầm máu trong các bệnh gây xuất huyết, chấn thương, bại huyết, viêm ruột do cầu trùng ghép E.coli, sung phù đầu ở gia súc, gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- **Lợn, Trâu, Bò:** 1g/5-8 kg TT/ ngày.

Hoặc hoà với 2 lít nước cho uống.

- **Gà, Vit, Ngan:** 1g/10-15 kg TT, hoà với 3 lít nước. Hoặc trộn với 50 kg thức ăn.



Túi 100g, 500g, 1kg

Zinmix-A15

(Các vitamin và khoáng chất)

Bổ dưỡng, tăng lực, chống cắn mổ

Công dụng:

- Cung cấp đầy đủ các vitamin, Acid amin và các khoáng vi lượng cần thiết cho mọi lứa tuổi của gia súc và gia cầm.
- Kích thích sinh trưởng, lớn nhanh, nâng cao năng suất thịt, tăng sản lượng trứng, sữa.
- Tăng cường sức đề kháng, phòng chống bệnh truyền nhiễm, chống Stress, tron lông, hồng da ở gia súc, chống rụng lông, cắn mổ nhau ở gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn thức ăn

- **Lợn con:**

100g trộn với 150 kg thức ăn

- **Lợn choai:**

100g trộn với 200 kg thức ăn

- **Bè, Nghe :**

100g trộn với 300 kg thức ăn

- **Gia cầm:**

100g trộn với 300 kg thức ăn

Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.



Túi 100g, 1kg

Điện Giải Vitamin

(Na, K, Ca, các vitamin)

Bù điện giải, chống mất nước. Bổ dưỡng, tăng lực, giải độc

Công dụng:

- Bổ sung điện giải trong các trường hợp mất nước do bị sốt cao, tiêu chảy kéo dài, những ngày nắng nóng, giải độc cơ thể...

- Bổ sung các vitamin nhóm B giúp tăng cường chuyển hóa, kích thích thèm ăn, bổ dưỡng tăng lực, phục hồi sức khỏe nhanh sau khi bị bệnh..

- Phòng chống stress trong quá trình vận chuyển, sáo đàn, thay đổi thời tiết, quá trình làm vaccin...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống

- **Gia cầm:** 1g/1 lít nước

- **Gia súc:** 1g/1-2 lít nước

Dùng liên tục trong những ngày nắng nóng và sốt cao.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực



Túi 200g, 500g, 1kg

Gluco K,C

(Vitamin C, K3, Glucose)

Bổ dưỡng - Tăng lực

Công dụng:

- Giải độc, chống nóng, chống mất nước, giảm mệt mỏi. Nâng cao sức đề kháng, tăng cường chuyển hoá, bổ dưỡng tăng lực...
- Phòng chống Stress trong quá trình vận chuyển gia súc, gia cầm.
- Hỗ trợ điều trị giải độc gan, đặc biệt kết hợp với Vitamin K3 giúp điều trị các chứng xuất huyết, bệnh cầu trùng, các bệnh dễ gây chảy máu.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hoà nước cho uống
- **Gia súc:** 1g / 1-2 lít nước
 - **Gia cầm:** 1g / 1 lít nước
- Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi



Túi 100g, 500g, 1kg

Boga - 4

(Các acid amin, Sorbitol, vitamin)

Giải độc gan thận, kích thích tiêu hóa, ngừa táo bón, phân sống ăn không tiêu

Công dụng:

- Lợi mật, bổ gan, bảo vệ tế bào gan, ngừa xơ gan, tăng cường tiêu hoá, chống táo bón, phân sống, ăn không tiêu, giải độc thận, tăng trọng lớn nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Gia súc:** 1g/10 kg TT/ ngày (1g/1 lít nước uống hoặc 2g/1 kg thức ăn)
 - **Gia cầm:** 1g/5-10 kg TT/ ngày (1g/1 lít nước uống hoặc 2g/1 kg thức ăn)



Túi 500g, 1kg, lon 1kg

Tertra - Trứng

(Các acid amin, vitamin, khoáng vi lượng)

Kích đẻ. Tăng sản lượng và chất lượng trứng.

Công dụng:

- Cung cấp đầy đủ các acid amin, khoáng vi lượng và các vitamin, kích đẻ nhiều, tăng sản lượng và chất lượng trứng.
- Tăng cường sự trao đổi chất, kích thích sự phát triển tế bào phôi trứng, tăng khả năng hấp thụ canxi, phòng bệnh đẻ non.
- Phòng chống bệnh tật, chống còi xương, bại liệt, suy dinh dưỡng.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 10g/100 kg TT.
Hoà với 10 lít nước cho uống. Hoặc 100g trộn với 80-100 kg thức ăn hỗn hợp.
Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi đối với gia cầm đẻ trứng.



Túi 100g, 1kg

Vita - Blex

(Các vitamin thiết yếu)

Phòng chống bệnh thiếu vitamin nhóm B, còi xương, bại liệt, suy dinh dưỡng

Công dụng:

- Phòng và trị bệnh thiếu Vitamin nhóm B, phòng chống Stress, chống còi cọc, xù lông, rụng móng, suy dinh dưỡng, kích thích tiêu hoá, tăng trọng, lớn nhanh.

Hướng dẫn sử dụng:

- Trộn thức ăn
- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 100g/ 300 - 400 kg TT/ ngày
 - **Bè, Nghé, Dê, Cừu:** 100g/ 500 kg TT/ ngày
 - **Lợn:** 100g/ 300 kg TT/ ngày

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 100g, 500g, 1kg, lon 1kg

ADE - VIT.C

(Các vitamin A, D, E, C)

Tron lông, hồng da, chống còi xương. Tăng sản lượng trứng.

Công dụng:

Bổ sung các loại Vitamin thiết yếu giúp duy trì sức khỏe vật nuôi, tăng sức đề kháng, kích thích tiêu hoá, tăng trọng, lớn nhanh, tron lông, hồng da ở gia súc, tăng sản lượng và chất lượng trứng ở gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
* **Gia súc:** 100g/300-500 kg TT, hoà với 100 lít nước cho uống. Hoặc 100g trộn với 100-150 kg thức ăn.

* **Gia cầm:** 100g/200-300 kg TT, hoà với 50 lít nước cho uống. Hoặc 100g trộn với 50-100 kg thức ăn hỗn hợp.

Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.



Túi 100g, 500g, 1kg

Vitamin C - 10%, 20%

(Vitamin C, acid citric)

Phòng chống stress, tăng cường sức đề kháng, phòng thiếu vitamin C

Công dụng:

- Chống stress cho gia súc, gia cầm khi nhiệt độ cao, lúc vận chuyển, bị đuổi bắt, chuyển chỗ, mật độ cao, dịch bệnh, cật mổ, chứng lở ngứa hoặc thay lông.

- Tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, phục hồi sức khỏe nhanh, phòng chống bệnh thiếu C gây chảy máu, sốt cao.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:**

1g/2-4 lít nước cho uống hàng ngày.

- **Lợn, bê, Dê, Cừu, Thỏ:** 1g/50 kg TT/ ngày hoặc 1g hoà với 2 lít nước cho uống.

- **Chó, mèo:** 1g/15-20kg TT/ ngày.



Túi 100g, 500g, 1kg

Canci - Vitab

(Ca, acid amin, vitamin)

Phòng bại liệt, chống còi xương. Tạo dày vỏ trứng

Công dụng:

- Bổ sung các vitamin và acid amin, tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi ở mọi lứa tuổi.

- Phòng bệnh thiếu Vitamin nhóm B, phòng chống bại liệt, xù lông, suy dinh dưỡng, giảm Stress, kích thích tiêu hoá, tăng trọng, lớn nhanh

- Bổ sung Canxi, tạo dày vỏ trứng, kích thích đẻ nhiều ở Gà, Vịt...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:**

10g/ 20-30 kg TT/ ngày.

- **Bê, Nghé, Lợn, Dê, Cừu, Thỏ:**

10g/ 40 kg TT/ ngày.

Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.



Túi 200g, 1kg

Beta - Glucamin

(Betaglucan, các acid amin)

Tăng cường hoạt động hệ miễn dịch

Công dụng:

- Tăng cường hoạt động hệ miễn dịch. Nâng cao sức đề kháng cơ thể, duy trì sức khỏe vật nuôi.

- Tăng cường khả năng đại thực bào giúp phòng ngừa một số bệnh vi sinh vật. Giúp cơ thể tự liền, tự khỏi, giảm ho.

- Thúc đẩy quá trình sinh kháng thể sau khi làm vaccin.

- Chống stress cho gia súc, gia cầm khi thay đổi môi trường, vận chuyển, mật độ cao, dịch bệnh....

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- **Gà, Vịt, Ngan, Cút:** 1g/ 1-2 lít nước uống. Hoặc trộn với 1kg thức ăn.

- **Lợn, bê, nghé, dê, cừu, thỏ:** 1-2g / 1 lít nước. Hoặc trộn với 1kg thức ăn.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực



Túi 500g, 1kg

MIX - 01

(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Dinh dưỡng dùng cho heo con tập ăn

Công dụng:

- Là hỗn hợp các vitamin, khoáng đa vi lượng và các acid amin kết hợp với men tiêu hoá cung cấp năng lượng gần giống sữa mẹ dùng cho lợn con mới sinh.
- Tăng cường sức đề kháng, phòng chống Stress, kích thích ăn nhiều, lớn nhanh.
- Kích thích tiêu hoá, phòng ngừa ỉa chảy, phân sống, bệnh lợn con phân trắng...

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn thức ăn

Heo con từ 7-8 ngày tuổi:

- Dùng 100g trộn với 5-10 kg thức ăn hỗn hợp.
- Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.



Túi 500g, 1kg

MIX - 06

(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Vỏ béo, nở mông, nở ức, dày lườn. Đỏ tích, kích mào, bột cựa

Công dụng:

- Tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giảm tiêu tốn cám, giảm mùi hôi chuồng trại, ngừa tiêu chảy, vỏ béo, nở mông, bung đùi
- Heo thịt tăng trọng nhanh, tron lông, hồng da, tỷ lệ nạc cao, thịt mềm
- Heo nái: nái khỏe, đẻ nhiều con, nhiều sữa, sữa tốt
- Gia cầm: đỏ tích, kích mào, bung lông, bột cựa, dày lườn, ngừa bại liệt, kích thích mọc lông nhanh, giảm stress...

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Lợn, Trâu, Bò, Dê, Cừu: 1g/10-15 kg TT/ngày hoặc trộn với 0,5-1kg thức ăn
- Gà, vịt, ngan, cút: 1g/5-8kg TT/ngày hoặc 1g/1-2 lít nước uống hoặc 1g/0,5-1kg thức ăn
- Dùng liên tục trong quá trình chăn nuôi để đạt hiệu quả cao



Túi 500g, 1kg

Đạm Sữa -05

(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)
Sản phẩm chuyên dùng cho trâu, bò sữa

Công dụng:

- Là hỗn hợp các Vitamin và khoáng đa vi lượng cùng kết hợp với các acid amin có mùi thơm đặc biệt, vị ngon, kích thích Bò sữa ăn nhiều, tăng tiết sữa, tăng sản lượng và chất lượng sữa.
- Cung cấp, hồi phục nhanh năng lượng cho Bò sau khi vắt sữa.
- Kích thích tiêu hoá, tăng trọng, ngừa tiêu chảy.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Trâu, Bò, Dê, Cừu: 100g trộn với 50 kg thức ăn hỗn hợp, hoặc hòa vào 10 lít nước cho uống hàng ngày.



Túi 100g, 500g, 1kg

B.Complex - K,C

(Các vitamin nhóm B, K, C)
Bổ dưỡng, tăng sức đề kháng

Công dụng:

- Phòng và chống các bệnh thiếu vitamin nhóm B, chống rối loạn trao đổi chất, nâng cao sức đề kháng, trợ lực cho vật nuôi khi bị ốm, giảm Stress khi thay đổi thời tiết, vận chuyển hoặc sáo đàn.
- Cải thiện hiệu quả thức ăn, kích thích sinh trưởng, ăn nhiều, lớn nhanh...
- Đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với kháng sinh trong điều trị bệnh cầu trùng...

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Gà, Vịt, Ngan, Cút, Thỏ:** 1g/1 lít nước uống. Hoặc 2g/1 kg thức ăn hỗn hợp.
- **Bê, Nghé, Dê, Cừu, Lợn:** 1g/15-20 kg TT/ ngày.
- Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 500g, 1kg

Amino - Vita (Bột Trộn thức ăn)

(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)

Dinh dưỡng cao cấp cho gia súc, gia cầm

Công dụng:

Sản phẩm bổ sung cân đối các axit amin, vitamin, khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm giúp tăng cường sức đề kháng, vật nuôi luôn khỏe.

- Tăng năng suất sản phẩm: Lợn, gà chóng lớn, giảm tiêu tốn thức ăn. Gà, vịt, bò câu, cút đẻ cao, đẻ bền, bền lông, phôi cao, chống mất màu trứng ở cút đẻ.

Lợn nái khỏe, nhiều con, nhiều sữa, sữa tốt, giảm tiêu chảy ở lợn con. Lợn nái mau lên giống, giảm tiêu chảy lợn con. Phòng chống stress...

Hướng dẫn sử dụng:

Bột Trộn thức ăn:

- **Heo, Gà, vịt, cút, bò câu:**

1kg / 300 – 500kg thức ăn

- **Heo nái, Gà, vịt, cút, bò câu**

đẻ: 1kg / 250 – 300kg thức ăn



Túi 500g, 1kg

Amino - Vita (Bột hòa tan trong nước)

(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)

Dinh dưỡng cao cấp cho gia súc, gia cầm

Công dụng:

Sản phẩm bổ sung cân đối các axit amin, vitamin, khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm giúp tăng cường sức đề kháng, vật nuôi luôn khỏe.

- Tăng năng suất sản phẩm: Lợn, gà chóng lớn, giảm tiêu tốn thức ăn. Gà, vịt, bò câu, cút đẻ cao, đẻ bền, bền lông, phôi cao, chống mất màu trứng ở cút đẻ.

Lợn nái khỏe, nhiều con, nhiều sữa, sữa tốt, giảm tiêu chảy ở lợn con. Lợn nái mau lên giống, giảm tiêu chảy lợn con. Phòng chống stress...

Hướng dẫn sử dụng:

Bột hòa tan trong nước hoặc trộn thức ăn:

- **Heo, gà, vịt, cút, bò câu:**

2g /2-3 lít nước

- **Heo nái, Gà, vịt, cút, bò câu đẻ:**

10g/ 5-6 lít nước.

Hoặc 10g/2,5-3kg thức ăn

Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi



Túi 100g, 500g, 1kg

ADE - VIT.C Trứng

(Vitamin A, D, E, C)

Kích đẻ, tăng sản lượng trứng

Công dụng:

- Kích đẻ, tăng tỷ lệ trứng, nở rộng giai đoạn đẻ trứng sai, tăng hấp thu canxi, giúp tạo dày vỏ trứng.

* Duy trì sự đẻ trứng bền, dài.

* Bổ sung và cung cấp các vitamin, chống còi xương, suy dinh dưỡng, tăng trọng nhanh.

Kích tăng sữa ở gia súc nái...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn.

- **Gà con và gà choai:** 10g hoà với 10 lít nước hoặc trộn với 0,5 kg thức ăn, dùng cho 40 con. (1 thìa cà phê dùng cho 20 con)

- **Gà mái, gà đẻ:** 10g pha với 2 lít nước hoặc trộn với 10 kg thức ăn, dùng cho 20 con. (1 thìa cà phê dùng cho 10 con)

- **Lợn, Bê, Nghé, Dê, Cừu:** 10g/80-100 kg TT/ ngày. Hoà nước cho uống. Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.



Túi 500g, 1kg, 10kg

P - Fattin

(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng, Sorbitol)

Vỗ béo gia cầm

Công dụng:

- Kích thích tăng trọng, gia cầm ăn nhiều, lớn nhanh, lông dày, bóng mượt, chân vàng, xương chắc, chống vẹo đầu, teo cơ, chống cắn mổ nhau.

- Giảm tỷ lệ chết gây ra do Stress

- Tăng cường chức năng gan, giúp loại thải các chất độc, bài thải acid uric ở thận do bệnh gây ra như Gumboro, thương hàn, CRD, CCRD.

- Tăng sức đề kháng, giúp cho gia súc và gia cầm hồi phục sức khỏe nhanh sau bệnh.

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn

- **Gia cầm:** 1kg/1000 lít nước uống. Hoặc 1 kg trộn với 500 kg thức ăn hỗn hợp.

- Thúc 20 ngày trước khi xuất chuồng: 1kg/50 lít nước. Hoặc 1 kg trộn với 500kg thức ăn hỗn hợp.

- **Gia súc:** 1 kg/500 lít nước uống hoặc 1 kg trộn với 500 kg thức ăn hỗn hợp.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực



Túi 500g, 1kg, 10kg

Etra - But

(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)

Vỗ béo, kích thích tăng trọng, siêu nạc, nở mông vai

Công dụng:

- Kích thích tăng trọng, giúp heo, gà, vịt, cút nhanh lớn.
- Tăng tỷ lệ nạc, giảm tỷ lệ mỡ trên quỳ thịt, to đùi, nở ức, nở vai, mông, tăng chất lượng xẻ thịt.
- Giúp tăng khả năng tiêu hoá thức ăn, giảm chi phí thức ăn, tiết kiệm thức ăn.
- Ngừa tiêu chảy, sung phù đầu.
- Giảm mùi hôi của chuồng trại.

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn với thức ăn
Heo thịt, Gà, Vịt, Ngan thịt:
1kg/1000 kg thức ăn hỗn hợp.
Dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.



Túi 500g, 1kg, 10kg

Supper - WG

(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)

Siêu tăng trọng

Công dụng:

- Cung cấp các loại vitamin và acid amin thiết yếu giúp cho gà, vịt, ngan, cút tăng trọng nhanh, chống còi cọc, nở ngực, nở ức, mau lớn.
- Tăng cường sức đề kháng, chống stress khi thời tiết thay đổi, tiêm phòng, chuyển chuồng, giải nhiệt nhanh, chống nóng, chống cắn mổ, ngừa rụng lông, xù lông.
- Tăng khả năng tiêu hoá thức ăn, ngừa tiêu chảy, giúp hồi phục nhanh sau khi ốm.
- Giảm mùi hôi chuồng trại.

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn với thức ăn
Heo thịt, Gà, Vịt, Ngan, Cút:
1kg/700 kg thức ăn hỗn hợp.
Dùng liên tục từ khi nuôi đến khi xuất bán.



Túi 500g, 1kg

AT10 - EGG (Bột trộn thức ăn)

(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)

Siêu trứng. Dinh dưỡng chuyên dùng cho gia cầm đẻ

Công dụng:

- Sản phẩm bổ sung cân đối các acid amin, vitamin, khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm có tác dụng: tăng sản lượng trứng từ 5-7%. Kéo dài thời gian đẻ sai, trứng to, đều, vỏ dày, bền màu, phôi khỏe, ấp nở cao. Giảm loại trứng méo mó, chống đẻ non.
- Gà, vịt non, choai tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ chết, chống bệnh còi xương.

Hướng dẫn sử dụng:

Thuốc bột trộn thức ăn
- **Gà, vịt, cút đẻ:** 100 – 150g / 50kg thức ăn. Đầu và cuối chu kỳ đẻ, khi gà, vịt, cút đẻ giảm, dùng liều gấp đôi.
- **Gia cầm non và hậu bị:** 100g / 50 – 100 kg thức ăn, dùng liên tục.



Túi 1kg

AT10 - EGG (Bột hòa tan trong nước)

(Vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)

Kích trứng. Dinh dưỡng chuyên dùng cho gia cầm đẻ

Công dụng:

- Sản phẩm bổ sung cân đối các acid amin, vitamin, khoáng vi lượng và vi lượng quý hiếm có tác dụng: tăng sản lượng trứng từ 5-7%. Kéo dài thời gian đẻ sai, trứng to, đều, vỏ dày, bền màu, phôi khỏe, ấp nở cao. Giảm loại trứng méo mó, chống đẻ non, chống rụng lông do ảnh hưởng thời tiết...
- Gà, vịt hậu bị: tăng sức đề kháng, chống bệnh còi xương, giảm tỷ lệ chết, phát dục tốt...

Hướng dẫn sử dụng:

Thuốc bột pha nước hoặc trộn thức ăn
- **Gà, vịt, ngan, cút đẻ:** 100g / 100 lít nước. Hoặc trộn 100g/50kg thức ăn
Đầu và cuối chu kỳ đẻ, khi gà, vịt, cút đẻ giảm, dùng liều gấp đôi.
- **Gia cầm hậu bị:** 100g/100-200 lít nước. Hoặc trộn 100g / 50 – 100 kg thức ăn, dùng liên tục trong thời gian chăn nuôi.

Sản phẩm Vitamin và thuốc bổ dưỡng, tăng lực

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 100g, 500g, 1kg

Điện giải Gluco K,C NEW

(Na, K, Ca, acid amin, vitamin)

Cân bằng điện giải, vitamin, Tăng khả năng chống nóng, chống mất nước, giải độc gan thận

Công dụng:

- Cung cấp chất điện giải, vitamin cho cơ thể đảm bảo cân bằng hệ đệm trong máu, giúp gia súc gia cầm tăng cường khả năng chống nóng, giải độc, chống mất nước cho cơ thể
- Chống ảnh hưởng stress khi vận chuyển đàn, làm vaccin...
- Nâng cao sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, phòng chống bệnh thiếu vitamin C gây chảy máu.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa vào nước cho uống.

- **Gia cầm:** gà, vịt, ngan, cút:
1g / 2-3 lít nước uống

- **Gia súc:**

+ Trâu, bò: 1g / 2-4 lít nước uống

+ Lợn, chó, mèo, dê, thỏ:

1g / 2-3 lít nước uống.



Túi 100g, 500g, 1kg

Vicaforte

(Các vitamin, acid amin, khoáng vi lượng)

Tăng trọng nhanh, nở mông, bụng dùi, đỏ tích, kích mào, bật cựa, chống cắn mổ

Công dụng:

- Tăng sức đề kháng, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, nâng cao hệ miễn dịch, tăng trọng nhanh cho gia súc, gia cầm
- Kích thích mọc lông, chống cắn mổ, ngừa còi xương, bại liệt
- Đỏ tích, kích mào, bật cựa, đẹp mã, nở mông, bụng dùi
- Giảm tiêu tốn thức ăn, phòng chống Stress...

Hướng dẫn sử dụng:

- **Gà, vịt, ngan, cút:** 1g / 10-15kg TT.
Hòa với 2-3 lít nước uống. Hoặc trộn với 1-2kg thức ăn

- **Lợn, dê, cừu, bê, nghé:**

1g / 15-20kg TT, hoặc trộn với 2-3kg thức ăn.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm Thuốc hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm



Chai 20ml, 100ml

Analgin - 30%

(Natri metamisol)

Hạ nhiệt, giảm đau, tiêu viêm

Công dụng:

Hạ nhiệt, chống sốt cao do nhiễm khuẩn, sung phù đầu, táo bón, bỏ ăn, điều trị cảm nắng, giảm đau trấn tĩnh gia súc.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Trâu, bò, ngựa:**
1ml / 20kg TT / ngày
- **Lợn, dê, cừu:**
1ml / 10kg TT / ngày
- **Chó, mèo:**
1ml / 5kg TT / ngày



Chai 20ml, 100ml

Analgin - C

(Natri metamisol, vitamin C)

Hạ nhiệt, giảm đau, phòng cảm cúm, trị viêm khớp

Công dụng:

- Phòng và điều trị các trường hợp cảm sốt, viêm khớp ở trâu, bò, lợn, gà, vịt...
- Tăng cường hiệu quả điều trị các bệnh truyền nhiễm khi kết hợp với kháng sinh.
- Phòng Stress khi thay đổi môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp

- **Trâu, Bò, Bê, Nghé:**
1ml / 8-10 kg TT / ngày
- **Lợn:** 1ml / 10 kg TT / ngày
- **Gà, Vịt:** 1ml / 5-7 kg TT / ngày, hoặc hòa vào nước cho uống.



Chai 20ml, 100ml

Gluconat K,C

(Cancigluconat, Viatamin C, K3, Natrimetamisol, Metyl paraben)

Hồi sức – Hạ nhiệt - Tăng sức đề kháng

Công dụng:

- Hồi sức cho gia súc trong thời kỳ mang thai, nuôi con bú, suy nhược cơ thể, sau khi ốm dậy.
- Tăng cường sức đề kháng, phòng chống stress
- Chống xuất huyết trong cơ thể khi bị sốt cao, và mắc các chứng bệnh truyền nhiễm
- Hỗ trợ điều trị bệnh kể phát tai xanh

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da

- **Bê, nghé, dê, cừu, lợn:**
1ml / 8-10kg TT / ngày
- **Vịt, ngan, ngỗng:**
1ml / 5-7kg/ ngày



Chai 100ml

Dexamethason

(Dexamethasol)

Đặc trị viêm khớp, hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản, sung phù đầu

Công dụng:

Dùng trong các trường hợp viêm khớp, thoái hoá khớp, hen suyễn, viêm thanh quản rít, phản ứng sốc phản vệ trong khi truyền thanh huyết, bệnh dị ứng nặng, bệnh viêm màng não phế cầu, bệnh phù đầu, bệnh viêm loét da và niêm mạc.

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch

- Trâu, Bò: 5-15 ml/ con
 - Bê, Dê, Cừu, Lợn: 1-2,5 ml/ con
 - Chó, Mèo: 0,25-1 ml/ con
- Dùng liên tục từ 3-5 ngày.

Sản phẩm Thuốc hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Chai 20ml, 100ml

Gluconat K, C H1

(Canxi gluconat, vitamin K, C)

Hồi sức, hạ nhiệt, tiêu viêm, tăng sức đề kháng

Công dụng:

- Hồi sức cho gia súc trong thời kỳ mang thai, nuôi con bú, suy nhược cơ thể, tăng sức đề kháng, chống xuất huyết các phủ tạng trong cơ thể...

- Đặc biệt hiệu quả trong hỗ trợ điều trị bệnh nhiễm trùng kế phát sốt đỏ, tai xanh...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da, hoặc cho uống

- Bê, nghé, dê, cừu, lợn:

1ml / 5-10kg TT / ngày

- Vịt, ngan, ngỗng:

1ml / 1 lít nước cho uống



Chai 20ml, 100ml

Diclofenac

(Diclofenac)

Kháng viêm, hạ sốt, giảm đau nhanh chóng

Công dụng:

- Đặc trị viêm khớp cấp và mạn tính, thoái hóa khớp, bại liệt, viêm gân, viêm cơ, viêm dây thần kinh, chấn thương, hậu phẫu.

- Điều trị chứng đau bụng cơ thắt ở ngựa và gia súc.

- Dùng trong điều trị bệnh nhiễm trùng kế phát sốt đỏ, tai xanh ở lợn...

Hướng dẫn sử dụng:

Tiêm bắp (IM)

Dùng liên tục từ 3-5 ngày.

Liều trung bình: 1ml / 10kg TT

* **Trâu, Bò, Ngựa:** 10-15ml / con

* **Lợn, Dê, Cừu, Bê:** 2-5-8ml / con

* **Lợn con:** 1-3ml / con

* **Chó, Mèo:** 0,3-3ml / con



Túi 100g, 1kg

Piretamol-12

(Acetaminophen, vitamin C)

Hạ sốt, tăng miễn dịch, phòng Gumboro, chống mất nước

Công dụng:

- Hạ nhiệt, chống mất nước khi gia súc, gia cầm bị sốt nhiễm trùng hoặc sốt không rõ nguyên nhân

- Bổ sung vitamin C, B giúp tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, chống stress khi thời tiết nắng nóng.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- Gà, vịt, ngan, cút:

1g/ 20 kg TT hoặc hòa với 2 lít nước.

Hoặc 1g/5 lít nước cho uống thường xuyên trong những ngày nắng nóng.

- Bê, nghé, dê, cừu:

1g/ 20 kg TT. Hoặc 1g/1,5 lít nước

- Lợn, chó, mèo:

1g/10kg TT, hoặc 1g / 1 lít nước



Túi 100g, 1kg

Analgin - C

(Analgin, vitamin C)

Hạ sốt, tăng cường sức đề kháng

Công dụng:

- Giải nhiệt, hạ sốt, cân bằng thân nhiệt khi thời tiết nắng nóng, tăng sức đề kháng, phòng chống Stress khi thay đổi thời tiết, môi trường, chuyển chuồng, tiêm phòng hoặc thay đổi thức ăn.

- Hỗ trợ điều trị sốt cao trong bệnh kế phát sốt đỏ (tai xanh) ở lợn, phòng chống Gumboro ở gà...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn

- Điều trị Hạ sốt:

Gia súc: 1g/10 kg TT/ ngày.

Gia cầm: 2-4g/1 lít nước uống.

- Trong những ngày nắng nóng: 2,5g/ 1 lít nước hoặc 1kg/200 kg thức ăn. Dùng liên tục

- Gia súc, gia cầm có dấu hiệu kém ăn:

2g/ 1 lít nước uống hoặc 1kg/ 250 kg thức ăn. Dùng liên tục đến khi gia súc, gia cầm ăn lại bình thường.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Sản phẩm

Thuốc hạ sốt, giảm đau, tiêu viêm



Chai 100ml, 500ml, 1 lít

Para-Oral

(Paracetamol)
Hạ sốt, giảm đau

Công dụng:

Hạ sốt, giảm đau nhanh trong những trường hợp bị viêm nhiễm do vi khuẩn, virus gây bệnh như viêm đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục, thoái hóa khớp. Hoặc sốt không rõ nguyên nhân...

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống, hoặc uống trực tiếp.
Dùng từ 3-5 ngày
- Gà, vịt, cút: 1ml/10-15kg TT/ngày. Hoặc hòa với 1-2 lít nước cho uống
- Lợn, gia súc: 1ml/10kg TT/ngày
Ngừng dùng thuốc trước khi giết mổ 01 ngày

Sản phẩm Men vi sinh vật



Túi 500g, 1kg

Saccharomyces

(Saccharomyces, acid amin...)
Men tiêu hóa sống, kích thích tăng trọng, giảm mùi hôi phân

Công dụng:

- Kích thích tiêu hóa, giảm tiêu tốn thức ăn, tăng trọng, tăng bổ sung chất dinh dưỡng, tăng sản lượng sữa và trứng...
- Đặc biệt có tác dụng ngừa tiêu chảy, chống rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân sống, E.coli...

Hướng dẫn sử dụng:

Trộn vào thức ăn nguội.
Dùng cho Trâu bò, Lợn, Gà, Vịt, Ngan, Ngỗng... trộn đều 0,5-1 kg/100 kg thức ăn. Cho ăn liên tục trong thời gian nuôi.



Túi 100g, 500g, 1kg, 10kg

PM2

(Saccharomyces, acid amin, vitamin...)
Ngừa tiêu chảy, kích thích tăng trọng.

Công dụng:

- Sản phẩm bổ sung vi sinh vật hữu ích, vitamin và khoáng giúp lợn con ở giai đoạn tập ăn tiêu hóa tốt thức ăn, ngừa tiêu chảy, giảm stress...
- Kích thích tiêu hóa tối đa thức ăn, gây sự thèm ăn ở lợn thịt, tăng trọng lớn nhanh, trơn lông hồng da, nâng cao năng suất chất lượng thịt (tạo cho thịt chắc và có màu hồng đỏ, tỷ lệ nạc cao...)

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
- Lợn con: trộn 100g với 50-100 kg thức ăn, trộn trực tiếp vào cám cho ăn cùng lợn mẹ hoặc hoà riêng vào máng cho uống.
- Lợn thịt: trộn 100g với 100-200 kg thức ăn. Cho ăn liên tục trong thời gian chăn nuôi.



Túi 100g, 1kg, lon 1kg

Biosub

(Saccharomyces, Bacillus subtilis, vitamin)
Men tiêu hóa ngừa tiêu chảy, Ecoli

Công dụng:

- Phòng và trị tiêu chảy, bệnh rối loạn tiêu hóa, ăn không tiêu, nhất là đối với lợn con theo mẹ sau cai sữa. Ngừa tiêu chảy, E.coli, bệnh sưng phù đầu...
- Tăng cường giúp tiêu hóa thức ăn, giảm mùi hôi của phân ảnh hưởng đến môi trường chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với thức ăn
* **Gia súc:** 100 g trộn với 100 kg thức ăn hỗn hợp
* **Gia cầm:** 100 g trộn với 100-150 kg thức ăn hỗn hợp



Túi 500g, 1kg, Thùng 10kg

Lactomin

(Lactobacillus, Bacillus subtilis, Saccharomyces, vitamin)

Men tiêu hóa ngừa tiêu chảy, kích thích tăng trọng

Công dụng:

- Phòng và ngăn ngừa bệnh đường ruột, bệnh tiêu chảy phân xanh, phân sống.
- Tăng cường khả năng tiêu hoá và hấp thụ thức ăn cho gia súc và gia cầm, rút ngắn thời gian chăn nuôi
- Giảm mùi hôi chuồng trại do khí NH₃ và H₂S nhằm cải thiện môi trường chăn nuôi
- Tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, giảm Stress cho gia súc, gia cầm.

Hướng dẫn sử dụng:

- Trộn thức ăn
- Lợn con, gà con: 1 kg trộn với 200 kg thức ăn
- Lợn thịt, gà đẻ, gà thịt: 1 kg trộn với 400 kg thức ăn
- Trâu, Bò, Dê, Cừu: 1 kg trộn với 500 kg thức ăn.



Túi 1kg

Lactomin cốm

(Các chủng men VSV, Lysin, Methionin, vitamin B1)

Men tiêu hóa cao cấp, dạng cốm – chịu kháng sinh, ngừa tiêu chảy, kích thích tăng trọng.

Công dụng:

- Bổ sung vitamin, acid amin và các vi khuẩn có ích hàm lượng cao, giúp vật nuôi và đặc biệt lợn con tiêu hóa triệt để thức ăn, ngừa tiêu chảy. Nâng cao khả năng hấp thu dinh dưỡng tối đa, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, giảm chi phí thức ăn.
- Giúp tái lập cân bằng và ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, ngừa rối loạn tiêu hóa gây phân sống, chướng bụng đầy hơi, tiêu chảy. Đặc biệt ở lợn con trước và sau cai sữa.
- Hạn chế mùi hôi chuồng trại do khí H₂S và NH₃.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- **Gia súc và lợn:** 1g/ 0,5-1 lít nước uống, hoặc 1kg/ 500-800kg thức ăn.
- **Lợn con:** 1 - 2g/ con, hoặc 1kg/ 200 - 300kg thức ăn
- **Gà, vịt, ngan, cút:** 1g/ 0,5-1 lít nước uống, hoặc 1kg/ 200 - 300kg thức ăn.



Túi 1kg

L - Nutrizym cốm

(Lactobacillus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lysin, Methionin, vitamin B1)

Cốm men cao cấp – ngừa tiêu chảy, chịu kháng sinh – kích thích tăng trọng

Công dụng:

- Dùng kết hợp với kháng sinh để tăng hiệu quả trong điều trị
- Bổ sung vitamin, acid amin và các chủng vi sinh vật có ích cho đường ruột với hàm lượng cao giúp vật nuôi tiêu hóa triệt để thức ăn phòng ngừa và hạn chế tối đa bệnh viêm ruột tiêu chảy, giúp vật nuôi hấp thu tối đa dinh dưỡng trong thức ăn, tăng trọng lớn nhanh, giảm chi phí thức ăn...
- Giúp tái lập cân bằng và ổn định hệ sinh vật đường ruột, phòng ngừa các bệnh rối loạn tiêu hóa, phân sống, tiêu chảy. Tăng sức đề kháng cho vật nuôi.
- Hạn chế mùi hôi chuồng trại, đảm bảo môi trường chăn nuôi sạch

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn với thức ăn
- **Gia súc và lợn:** 1g / 0,5-1 lít nước uống. Hoặc trộn 1kg / 500-1000kg thức ăn
- **Gà, vịt, ngan, cút:** 1g / 0,5-1 lít nước uống. Hoặc trộn 1kg / 500kg thức ăn.



Túi 500g, 1kg, lon 1kg

L - Nutrizym

(Lactobacillus, bacillus subtilis, L-Lactic, L-bifidobacterium, vitamin B1)
Men tiêu hóa hòa tan ngừa tiêu chảy

Công dụng:

- Là chế phẩm sinh học gồm các chủng vi khuẩn sống giúp ổn định hệ sinh vật đường ruột, phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa, tăng khả năng đề kháng cho vật nuôi.
- Phòng ngừa hữu hiệu chứng chướng bụng đầy hơi ở gia súc và gia cầm, đặc biệt đối với bệnh lợn con phân trắng.
- Hạn chế mùi hôi trong phân gây ra do khí NH₃ và H₂S, nhằm cải thiện môi trường chăn nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, vịt, ngan, cút: 1g/0,5-1 lít nước uống. Hoặc 1kg / 500 kg thức ăn.
 - Trâu, bò, lợn, dê, cừu: 1g/0,5-1 lít nước uống. Hoặc 1kg / 500-1000 kg thức ăn

Sản phẩm Thuốc trị ký sinh trùng



Chai 10ml, 20ml, 100ml

Levamisol - 7%

(Levamisol)
Đặc trị tẩy giun sán

Công dụng:

Đặc trị tẩy giun sán, ký sinh trùng đường ruột như: Giun đũa, giun tóc, giun móc, giun kim. Ký sinh trùng đường phổi như: Giun phổi...

Hướng dẫn sử dụng:

- Tiêm bắp, tiêm dưới da
- Trâu, Bò: 1ml /12 kg TT
 - Lợn, Dê, Cừu: 1ml /10 kg TT
 - Chó, Mèo: 1ml /10 kg TT
 - Gà, Vịt, Ngan, Cút: 1ml /3-5 kg TT hòa nước cho uống.



Chai 10ml, 100ml

Ivermectin - 50

(Ivermectin)
Thuốc tẩy nội, ngoại ký sinh trùng

Công dụng:

- Đặc trị tẩy giun đũa, giun móc, giun lươn, giun kim, giun kết mạc, giun dạ dày, giun ruột già, giun phổi ở Trâu, Bò, Lợn, Dê, Cừu, Chó, Mèo, Thỏ.
- Phòng và diệt các loại ghẻ, ve, bọ chét, chấy, rận, mòng...

Hướng dẫn sử dụng:

- Tiêm dưới da
- Liều trung bình: 0,4-0,5 ml/ kg TT/ ngày
- * Trâu, Bò: 20 ml/50 kg TT
 - * Dê, Cừu: 1 ml/25 kg TT
 - * Lợn: 0,6 ml/16 kg TT
 - * Chó, Mèo: 0,1-0,15 ml/2 kg TT
- Dùng trong 3 ngày



Chai 100ml, 250ml, 500ml

Trimcox - 500

(Trimethoprim, Sulfadiazin)
Đặc trị cầu trùng ỉa ra máu tươi, phân đỏ, phân sáp

Công dụng:

Đặc trị cầu trùng ỉa ra máu tươi, phân đỏ, phân sáp, phân lẫn máu, viêm ruột ỉa chảy, E.coli, sung phù đầu, thương hàn, viêm phổi, viêm phế quản, viêm vú, viêm tử cung, bệnh tụ huyết trùng.

Hướng dẫn sử dụng:

- Lắc kỹ trước khi dùng
- Gia cầm & Lợn: 1 ml pha vào 3 lít nước cho uống
 - Bê, Dê, Cừu: 1 ml/ 20 kg TT/ lần. Ngày dùng 2 lần. Dùng liên tục từ 4-7 ngày.



Chai 100ml, 500ml, 1lit

Toltra-cox

(Toltrazuril)

Đặc trị bệnh cầu trùng gà, vịt

Công dụng:

Điều trị cầu trùng ở tất cả các giai đoạn của Eimeria spp gây bệnh tiêu chảy ra máu tươi, phân sấp, phân đỏ, phân lẫn máu ở gà, vịt

Hướng dẫn sử dụng:

- Hòa vào nước cho uống
- 100ml / 100 lít nước uống dùng liên tục trong 48h
- Hoặc 150ml / 50 lít nước uống dùng 8h/ngày
Dùng liên tục 2 ngày



Chai 100ml, 500ml, 1lit

Toltrazuril

(Toltrazuril)

Phòng và trị cầu trùng trên lợn con, bê, nghé

Công dụng:

- Trị bệnh cầu trùng trên lợn và gia súc biểu hiện tiêu chảy phân có màu vàng, xám, phân lẫn máu
- Trị bệnh nhiễm trùng kế phát như E.coli, Clostridium hoặc Rotavirus gây viêm ruột hoại tử...

Hướng dẫn sử dụng:

Nhỏ trực tiếp hoặc hòa nước cho uống
- **Lợn con** 3-5 ngày tuổi uống 1 liều duy nhất: 0,5ml / con
- **Lợn choai:** 1ml / 2,5-3kg TT/ ngày
- **Đê, cừu non:** 1,5ml/ 10kg TT dùng liên tục 3-5 ngày.
Liều phòng bằng 1/2 liều điều trị, phòng định kỳ cách 7-10 ngày.



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

NGH - Anticoccid

(Trimethoprim, Sulfamethoxazol)

Đặc trị cầu trùng cấp, ỉa ra máu tươi

Công dụng:

- Gà, Vịt, Ngan, Cút: Đặc trị bệnh cầu trùng ruột non ỉa ra máu tươi, bệnh tiêu chảy do E.coli, phân xanh, phân trắng, tụ huyết trùng, chướng điêu khô chân, phòng Gumboro ở gà
- Bê, Nghé, Lợn, Đê, Cừu non: Đặc trị bệnh cầu trùng ruột non ỉa ra máu tươi, phân nhầy lẫn máu, viêm ruột ỉa chảy nặng, E.coli, phân nhớt, phân vàng, bệnh lý, Lợn con phân trắng...

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà với nước cho uống hoặc trộn vào thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 1-2g/10 kg TT/ ngày. Hoà với 1 lít nước cho uống.
- Bê, Nghé, Lợn, Đê, Cừu non: 1-2g/10 kg TT/ ngày.. Dùng liên tục 3-5 ngày



Túi 2g, 10g, 50g, 100g, 1kg

Levamysol

(Levamysol)

Đặc trị tẩy giun sán

Công dụng:

Đặc trị tẩy giun sán, ký sinh trùng đường ruột như: Giun đũa, giun tóc, giun móc, giun lươn, giun kim, giun phổi.

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước cho uống hoặc trộn thức ăn
- Gà, Vịt, Ngan, Cút: 10g / 25-30 kg TT
- Trâu, Bò: 10g / 50-75 kg TT
- Chó, Mèo: 10g / 25-30 kg TT
- Lợn, Đê, Cừu: 10g / 50-75 kg TT



Túi 50g, 100g, 1kg

Nistatin-50

(Nystatin)

Đặc trị: Nấm miệng, nấm điều, nấm phổi

Công dụng:

- Phòng và điều trị bệnh nấm (da, niêm mạc miệng, thực quản, điều, ruột) trên da cầm do nấm candida abicans gây nên
- Trị nấm phổi do nấm Aspergillus gây ra trên gia cầm và đại gia súc
- Nên dùng kết hợp với kháng sinh để điều trị bệnh tiêu chảy

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn vào thức ăn
Dùng liên tục từ 3-5 ngày

- Liều điều trị:

+ **Gia cầm, chim cút:** 1g/6-8kg TT/ngày, hoặc hòa với 1-2 lít nước uống

+ **Gia súc:**

1g/8-10kg TT/ ngày, hoặc 2,5g/1-2kg thức ăn

- Liều phòng: 0,5-1g/1kg thức ăn

* Chú ý: không dùng đồng thời với VTM B và thuốc kích nhu động ruột, các chất bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa vì làm mất tác dụng của Nystatin



Chai 100ml

Dec - Spray

(Deltamethrin)

Đặc trị: Ve, ghẻ, bọ chét, rận, ruồi, muỗi

Công dụng:

Phòng và diệt bọ chét, ve, chích, rận, ghẻ, muỗi, ruồi, kiến, gián, mối, bọ mạt ở chó, mèo, lợn, dê, cừu, trâu, bò và gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:

Phun liều trung bình:

- Chó: 10-12 lần xịt / kg TT

- Mèo: 5-6 lần xịt / kg TT

Phun ngược chiều lông cho đều toàn thân với khoảng cách 10-20cm, đặc biệt là vùng đầu, tai, 4 bàn chân, đuôi và cổ. Không tắm cho thú trước và sau khi phun 48 giờ

LỊCH DÙNG:

- Bọ chét, ve, bét: Phun 2 lần cách nhau 10-15 ngày

- Mạt, chích, rận: Phun 1 lần là hết

- Ghẻ: Phun 2 lần, cách nhau 5-7 ngày



Túi 10g, 50g, 100g, 1kg

Trị Cầu Trùng

(Sulfachlopyridazin)

Trị cầu trùng ruột non, phân đỏ, phân sấp

Công dụng:

- Gia cầm: phòng và trị cầu trùng ruột non, cầu trùng manh tràng ỉa ra máu tươi (phân đỏ, phân sấp, phân lẫn máu), bệnh cầu trùng ghép E.coli...

- Lợn, Bê, Nghé, Dê, Cừu: Đặc trị cầu trùng, phân trắng, phân vàng, phân đen, tiêu chảy dùng kháng sinh không khỏi.

- Thỏ: trị tiêu chảy, phân lẫn máu hoặc có màng giả

Hướng dẫn sử dụng:

Hoà vào nước cho uống hoặc trộn với thức ăn

- Gà, Vịt, Ngan, Cút, Thỏ: 1g/3-5kg TT/ ngày. Hoặc 1-2g/1 lít nước

- Bê, Nghé, Dê, Cừu, Lợn con: 10g/70-100 kg TT/ ngày. Bệnh nặng dùng liều gấp đôi.

Dùng liên tục 3-5 ngày.

Sản phẩm Thuốc trị ký sinh trùng

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi



Túi 5g

Albendazol

(Albendazol)

Đặc trị tẩy giun, sán, ký sinh trùng đường ruột

Công dụng:

Đặc trị tẩy các loại ký sinh trùng đường ruột như giun tóc, giun móc, giun kim, giun lươn..., các loại sán và ấu trùng sán ở gia súc, gia cầm

Hướng dẫn sử dụng:

Hòa nước uống hoặc trộn thức ăn

- Lợn, chó, mèo: 1g / 5-7kg TT

Trường hợp mắc sán lá gan: 1g / 3-5kg TT

- Bê, nghé, dê, cừu: 1g / 6kg TT

Trường hợp mắc sán lá gan: 10g / 5kg TT

- Gia cầm: 1g / 5kg TT

Lưu ý: Không dùng cho gia súc mang thai thời kỳ 1-45 ngày

Sản phẩm Thuốc sát trùng

Povidine -10%

(Povidone iodine)

Iod hữu cơ sát trùng, tẩy uế chuồng trại



Chai 100ml, 1 lít

Công dụng:

- Là iod hữu cơ có tác dụng sát trùng tốt ở hầu hết các loại:

+ Virus: cúm gà, Newcastle, Gumboro, dịch tả lợn, dịch tả vịt, lở mồm long móng...

+ Vi khuẩn: Gram (+), Gram (-), xoắn khuẩn, đơn bào. Các loại nha bào, nấm mốc và khử làm mất các mùi hôi thối.

- Thuốc dùng để khử chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, môi trường chăn nuôi xung quanh khu chăn nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

- Tiêu độc chuồng trại: Pha với nước sạch:

1 lít/100-200 lít nước. Phun đều bề mặt chuồng, dụng cụ chăn nuôi và môi trường xung quanh. Tuần 1-2 lần, liên tục 2-3 tuần.

- Sát trùng vết thương hay vết lở loét do bệnh lở mồm long móng. Pha ½ bôi trực tiếp lên vết thương.

- Sát trùng tay chân, nơi tiêm, vùng mổ, thiến, hoạn 10 ml/1 lít nước.





CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN
HUNG NGUYEN JSC

Bộ sản phẩm Úm dùm cho gia cầm và thủy cầm



Chicken-01


Bộ úm dùm cho 500 Gà từ 01-07 ngày tuổi
Gồm 3 sản phẩm: Thiamphenicol-10%, Meta-Kazol, Butasal-B12

Công dụng:

- Sự kết hợp của 3 sản phẩm làm tăng tác dụng trong úm gia cầm
- Chống gà chết khô chân, tiêu chảy, không tiêu lòng đỏ
 - Chống gà ốm, chết do làm vaccin
 - Gà khỏe, phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống cao

Hướng dẫn sử dụng:

- Chia đều các loại dùm liên tục trong 6 ngày
- Có thể dùm thêm với Điện giải Gluco K,C và Amino-Vita



Duck-01


Bộ úm dùm cho 500 Gà từ 10-15 ngày tuổi
Gồm 4 sản phẩm: Meta-Kazol, Amino-vita, Beta-glucamin, Amocoli-forte

Công dụng:

- Phòng triệt để hen gà do nhiễm vi khuẩn
- Tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch, ổn định sức khỏe, giúp gà con phát triển tốt
- Chống gà ốm, khó chữa, sau khi làm vaccin

Hướng dẫn sử dụng:

- Chia đều các loại dùm liên tục trong 5 ngày





TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

HÙNG NGUYỄN

Đồng hành cùng người chăn nuôi

- Sản phẩm chất lượng cao, giá hợp lý
- Dịch vụ kỹ thuật, trợ giúp khách hàng tốt nhất

"An toàn - Năng suất - Hiệu quả"

GIẢI PHÁP TỐI ƯU: VẬT NUÔI LUÔN KHỎE !!!

1. Thường xuyên, định kỳ bổ sung: trong thức ăn, nước uống:

- + Amino – Vita
- + Beta – glucamin
- Vật nuôi tự khỏe. Có sức kháng bệnh cao, nâng cao năng suất chăn nuôi

2. Định kỳ phòng bệnh truyền nhiễm vi trùng bằng kháng sinh trộn thức ăn:

Có thể dùng một trong các loại sau:

- + Flor – 400, Thiamphenicol – 10%
- + Amoxil – 100, Amo – coliforte
- Phòng tốt bệnh truyền nhiễm do vi trùng gây bệnh

3. Chủ động phòng vaccin – “Đúng kỹ thuật”

- Phòng có hiệu quả bệnh dịch truyền nhiễm do virus.





HÙNG NGUYỄN .J.S.C
GMP-GLP-GSP

HÙNG NGUYỄN
Đồng hành cùng người chăn nuôi

CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG NGUYỄN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y ĐẠT CHUẨN GMP-WHO
Khu CN Mỹ Hào - Hưng Yên - Tel: 0221 3948 033/ 3948035
Website: www.thuochuyhungnguyen.com

Tư vấn trực tiếp

BS. PHAN KHẮC BẢO
Mobile: 0978 056 247

BS. NGUYỄN VĂN TÌNH
Mobile: 0334 55 11 79

BS. TRẦN ĐOÀN NAM
Mobile: 0987 244 303